



ENTEROSGEL®

Detoxifying agent



Gastrointestinal adsorbent for use in Acute diarrhoea and Irritable bowel syndrome with diarrhoea

WHAT IS IN THIS LEAFLET

1. What is ENTEROSGEL® and what it is used for
2. What you need to know before you take ENTEROSGEL®
3. How to take ENTEROSGEL®
4. Possible side effects
5. How to store ENTEROSGEL®
6. Content of the pack and other information

1. WHAT IS ENTEROSGEL® AND WHAT IT IS USED FOR

ENTEROSGEL® is an oral suspension indicated for the:

- Symptomatic treatment of acute diarrhoea.
- Treatment of Irritable bowel syndrome with diarrhoea (IBS-D).

ENTEROSGEL® is an oral intestinal adsorbent (enterosorbent) based on organic mineral with adsorption capacity towards some toxic and harmful substances in the gut (e.g. endotoxins, enterotoxins), physically binding them to its surface, reducing stool frequency and duration of diarrhoea.

ENTEROSGEL® is expelled from the body with the stool, this way eliminating the adsorbed toxins and harmful substances, which can be beneficial for treatment of indicated conditions.

ENTEROSGEL® relieves symptoms of diarrhoea, abdominal pain, bloating and urgency in IBS-D patients.

ENTEROSGEL® is free from preservatives, gluten, sugar, sweeteners, lactose, fat, flavours, colouring, plant or animal-derived ingredients.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE ENTEROSGEL®

Do not use ENTEROSGEL® if (contraindications):

- you are currently taking modified-release orally administrated medications.
- you have intestinal atony or intestinal blockage (sever constipation due to bowel obstruction).
- you have intolerance based on prior use of ENTEROSGEL®

Precautions

- Do not use ENTEROSGEL® within 2 hours before or after taking oral medication. ENTEROSGEL® may affect the absorption of some medicines that are administered orally. If you are taking any medication, you may wish to consult with your doctor or pharmacist regarding taking ENTEROSGEL®.
- In case of long-term diarrhoea you should consult a doctor to obtain

a diagnosis of the underlining condition before taking ENTEROSGEL®.

- In children, treatment of diarrhoea should be accompanied by plenty of fluids which may include an oral rehydration solution (ORS) to avoid dehydration.
- In adults, it is advisable to consume water or an ORS during the treatment with ENTEROSGEL® to assure proper hydration.
- Do not exceed the recommended duration of treatment and do not take together with meals to avoid possible adsorption of vitamins or nutrients.
- If diarrhoeal symptoms persist for more than 2 days you should consult your doctor.
- If there is fever, blood in your stools, signs of dehydration, six or more episodes of diarrhoea in the last 24 hours, diarrhoea and vomiting at the same time, or a severe or continuous stomach ache, seek medical advice especially in the case of children as soon as possible.
- Do not exceed the recommended dose and do not exceed the recommended duration of treatment
- Please, consult your doctor if you are currently taking other intestinal adsorbents, for example treatments which contain activated charcoal, clay, kaolin. Your doctor may advise not to use them together with ENTEROSGEL® treatment.
- ENTEROSGEL® is not indicated for use in case of acute chemical or drug poisoning or medicinal overdose.
- Do not use beyond the expiry date indicated on the package.

ENTEROSGEL® can be used during pregnancy and breastfeeding. It is advisable to consult with your healthcare professional if you are unwell during pregnancy or breastfeeding. Please, consult your doctor before taking ENTEROSGEL®.

3. HOW TO TAKE ENTEROSGEL®

- Take the necessary dose of ENTEROSGEL® after the first loose stool.
- Take ENTEROSGEL® at least 2 hours before or after taking oral medications.
- Take ENTEROSGEL® at least 1–2 hours before or after meal.
- Dilute the dose in the water of room temperature before its administration.
- Use sachet immediately after opening.
- Shake the tube well before opening and each use.
- Use a tube within 30 days after opening.



Age	Dosage	How often
Under 1 years	2.5g (\approx 1/2 teaspoon) diluted in 7.5–15ml of water.	3 times a day
1–6 years old	5g (\approx 1 teaspoon) diluted in 50–100ml of water.	3 times a day
7–14 years old	10g (\approx 2 teaspoons) diluted in 50–100ml of water.	3 times a day
15+ and adults	15g to 22.5g (\approx 1 tablespoon or 1–1.5 sachet) diluted in 200ml of water.	3 times a day



ENTEROSGEL®

Detoxifying agent

Duration of the treatment with ENTEROSGEL® is:

- 3–5 days for acute diarrhoea
- Up to 30 days for IBS-D. Break between repeated use should be at least 3 days.
- Prior to use in children under 3 years old it is advisable to consult a doctor.
- In the beginning of the treatment (on day 1) you can double the first dose and then continue with a single dose after each bowel movement. Maximum 8 doses on the first day.
- During treatment of chronic diarrhoea you may adjust your dosage to suit your stool consistency and bowel movements. You can increase treatment to a double dose up to 3 times a day if your stool is loose, or reduce to a single dose once a day if your stool is normal. Maximum 6 doses per day.
- Stop the treatment with ENTEROSGEL® if you do not have a bowel movement for 1–2 days, increase intake of water and continue the treatment after the next bowel movement.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Constipation, nausea

5. HOW TO STORE ENTEROSGEL®

- ENTEROSGEL® should not be used after the expiry date on the package.
- Keep out of reach of children.
- Store ENTEROSGEL® at temperature between 4 °C to 30 °C.
- Do not freeze.
- Keep away from direct sunlight and heat.
- The expiration date on the package refers to when the product is unopened and when properly stored.

For sachets

- Each sachet should be used only once after it is opened.
- Each sachet is disposable and should be opened immediately before use.
- Do not reuse partially used sachets to prevent microbial contamination.

For tubes

- Close the lid of the tube tightly after opening and after each use to avoid drying and to prevent microbial contamination.

When squeezing ENTEROSGEL® out of the tube or a sachet some amount of liquid may appear.

6. CONTENT OF THE PACK AND OTHER INFORMATION

Composition: Polymethylsiloxane polyhydrate (methylsilicic acid hydrogel) – 70%, purified water – 30%.

Package size

- ENTEROSGEL® oral suspension
- Tube 225 g
 - Tube 90 g
 - Sachet 15 g (10 sachets per pack)

DISPOSAL

There are no special disposal requirements for unused ENTEROSGEL®. It can be safely disposed into the domestic waste. Packaging can be recycled.

Shelf life: Until date indicated on package

If you have any further questions about use of ENTEROSGEL® please email: info@enterosgel.eu.

This instructions for use leaflet (IFU) is also available in other languages at www.enterosgel.eu.

MANUFACTURER:

Bioline Products s.r.o.
Krakovská 1338/10,
110 00 Prague, Czech Republic
www.enterosgel.eu

LEAFLET DATE OF UPDATED ISSUE: 08.08.2022

VERSION: TUV/IFU/EN/NB/2

EXPLANATION OF GRAPHIC SYMBOLS USED ON PACKAGE:



Do not re-use



Certified medical device



Minimum shelf life



Disposable packaging

LOT

Batch code



Dispose of used packaging in appropriate waste receptacle. Packaging can be recycled.



Manufacturer



A fee for the national packaging management system has been paid for this packaging.



Please read the instructions



Temperature range



Keep away from direct sunlight

CE 0123

Medical Device class IIa



ENTEROSGEL®

Detoxikačná pomôcka

Gastrointestinálny adsorbent na užívanie pri akútnej hnačke a syndróme dráždivého čreva s hnačkou



V TEJTO PÍSOMNEJ INFORMÁCII SA DOZVIETE

- 1. Čo je ENTEROSGEL® a na čo sa používa
- 2. Čo potrebujete vedieť pred použitím ENTEROSGEL®
- 3. Ako užívať ENTEROSGEL®
- 4. Možné vedľajšie účinky
- 5. Ako uchovávať ENTEROSGEL®
- 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. ČO JE ENTEROSGEL® A NA ČO SA POUŽÍVA

ENTEROSGEL® je perorálna suspenzia indikovaná na:

- symptomatickú liečbu akútnych hnačkových ochorení,
- syndróm dráždivého čreva s hnačkou (IBS-D).

ENTEROSGEL® je perorálny črevný adsorbent (enterosorbent) na báze organického minerálu s adsorpčnou schopnosťou voči niektorým toxicým a škodlivým látкам v čreve (napr. endotoxínom, enterotoxínom), ktoré fyzicky viaže na svoj povrch a znížuje tak frekvenciu vyprázdňovania stolice a trvanie hnačky.

ENTEROSGEL® odchádza z tela so stolicou a tým odstraňuje adsorbované toxíny a škodlivé látky, čo môže mať blahodarný účinok pri liečbe indikovaných stavov.

ENTEROSGEL® zmierňuje hnačku, bolesti brucha, nafukovanie a nutkanie na vyprázdenie u pacientov s IBS-D.

ENTEROSGEL® neobsahuje konzervačné látky, lepok, cukor, sladidlá, laktózu, tuky, arómy, ingredience rastlinného ani živočíšného pôvodu.

2. ČO POTREBUJETE VEDIĘT PRED POUŽITÍM ENTEROSGELU®

Neužívajte ENTEROSGEL® (kontraindikácie):

- ak súčasne užívate perorálne lieky s modifikovaným (riadeným) uvoľňovaním,
- ak trpíte črevnou atóniou alebo črevnou nepriechodnosťou (závažnou zápchou z dôvodu črevnej obstrukcie),
- v prípade intolerancie pomôcky počas užívania v minulosti.

Upozornenia a opatrenia

- Neužívajte ENTEROSGEL® menej ako dve hodiny pred užitím alebo po užití perorálneho lieku - ENTEROSGEL® môže ovplyvniť adsorpciu niektorých liekov, ktoré sa podávajú perorálne. Ak užívate nejaké lieky, môžete sa tiež o použití pomôcky ENTEROSGEL® poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
- V prípade dlhotrvajúcej hnačky je nutné poradiť sa pred užívaním pomôcky ENTEROSGEL® s lekárom za účelom stanovenia diagnózy základného ochorenia.

• U detí by liečba hnačky mala byť doplnená podaním dostatočného množstva tekutín, prípadne perorálneho rehydratačného roztoku, aby nedošlo k dehydratácii.

- U dospelých osôb sa odporúča počas liečby pomôckou ENTEROSGEL® príjem tekutín alebo perorálneho rehydratačného roztoku na zabezpečenie správnej rehydratácie.
- Neprekračujte odporúcanú dobu liečby a neužívajte spolu s jedlom, aby ste sa vyhli možnej adsorpcii vitamínov alebo živín.
- Ak hnačka trvá viac ako dva dni, je nutné poradiť sa s lekárom.
- Ak máte horúčku, krv v stolicí, známy dehydratácia, šesť alebo viac stolič počas posledných 24 hodín, súčasne hnačku a vracanie, silné alebo neustále bolesti brucha, vyhľadajte čo najskôr lekársku pomoc, najmä ak ide o deti.
- Neprekračujte odporúcanú dávku a neprekračujte odporúcanú dobu liečby.
- Porozprávajte sa, prosím, so svojím lekárom, ak v súčasnosti užívate iné črevné adsorbenty, napríklad pomôcky, ktoré obsahujú aktívne uhlie, il alebo kaolin. Vás lekár vám možno poradí, aby ste ich neužívali súčasne s pomôckou ENTEROSGEL®.
- ENTEROSGEL® nie je indikovaný na užívanie v prípade akútnej chemickej ottravy ani predávkovania liekmi.
- Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale.

ENTEROSGEL® možno užívať počas tehotenstva a dojčenia. Ak sa počas tehotenstva alebo dojčenia necítite dobre, odporúča sa, aby ste sa poradili so svojím lekárom. Pred užitím pomôcky ENTEROSGEL® sa, prosím, poradte so svojím lekárom.

3. AKO UŽÍVAŤ ENTEROSGEL®

- Užite potrebnú dávku pomôcky ENTEROSGEL® po prvej riedkej stolici.
- Užívajte ENTEROSGEL® minimálne 2 hodiny pred užitím alebo po užíti perorálneho lieku.
- Užívajte ENTEROSGEL® minimálne 1 – 2 hodiny pred jedlom alebo po ňom.
- Pred podaním rozdiľte dávku vo vode, ktorá má izbovú teplotu.
- Sáčok použíte ihneď po otvorení.
- Tubu dobre pretrepte pred otvorením a každým použitím.
- Tubu použíte do 30 dní od otvorenia.



Vek	Dávkovanie	Ako často
Do 1 roka	2,5 g (= 1/2 čajovej lyžičky) zriediť v 7,5 – 15 ml vody.	3x denne
1 – 6 rokov	5 g (= 1 čajová lyžička) zriediť v 50 – 100 ml vody.	3x denne
7 – 14 rokov	10 g (= 2 čajové lyžičky) zriediť v 50 – 100 ml vody.	3x denne
15+ a dospelí	15 g až 22,5 g (= 1 polievková lyžica alebo 1 – 1,5 sáčku) zriediť v 200 ml vody.	3x denne



Doba liečby pomôckou ENTEROSGEL® je:

- 3 – 5 dní pri akútnej hnačke,
- až 30 dní pri syndróme dráždivého čreva s hnačkou. Prestávka medzi opakováním použitím by mala byť aspoň 3 dni.
- Pred použitím u detí do troch rokov sa odporúča poradiť sa s lekárom.
- Na začiatku liečby (1. deň) môžete zdvojnásobiť prvú dávku a potom pokračovať s jednotlivou dávkou po každej stolici. Prvý deň maximálne osiem dávok.
- Počas liečby chronickej hnačky môžete upravovať dávkovanie tak, aby zo-dpovedalo konzistencii a častoti stolice. Môže sa užiť dvojnásobná dávka až 3x denne ak je stolica riedka, alebo znížiť na jednu dávku 1x denne ak je stolica normálna. Maximálne možno užiť šesť dávok denne.
- Liečbu pomôckou ENTEROSGEL® prerušte, ak 1 – 2 dni nemáte stolicu, zvýšte prijem vody a pokračujte v liečbe po ďalšej stolici.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Zápcha, nevolnosť (nauzea)

5. AKO UCHOVÁVAŤ ENTEROSGEL®

- ENTEROSGEL® sa nesmie použiť po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Uchovávajte ENTEROSGEL® pri teplotách od 4 °C do 30 °C.
- Chráňte pred mrazom.
- Nevystavujte nadmernému teplu ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Doba použiteľnosti uvedená na obale sa vzťahuje na riadne skladovaný neotvorený produkt.

Sáčky

- Po otvorení možno každý sáčok použiť len raz.
- Sáčky sú na jedno použitie a musia sa otvárať bezprostredne pred použitím.
- Nepoužívajte opäť častočne použité sáčky, aby ste zabránili mikrobiál-nemu znečisteniu.

Tuby

- Po otvorení a každom použití uzavrite pevne viečko tuby, aby nedošlo k vysychaniu a mikrobiálнемu znečisteniu.

Pri vytáčaní pomôcky ENTEROSGEL® z tuby alebo sáčku sa môže objaviť malé množstvo tekutiny.

6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Zloženie: polymetylsiloxan polyhydrát (hydrogél kyseliny metylkremičitej) – 70 %, čistená voda – 30 %.

Veľkosť balení

- ENTEROSGEL® perorálna suspenzia
- Tuba 225 g
 - Tuba 90 g
 - Sáčok 15 g (10 sáčkov v balení)

LIKVIDÁCIA

Na likvidáciu nepoužitej pomôcky ENTEROSGEL® sa nevzťahujú žiadne oso-bitné opatrenia. Pomôcku možno bezpečne vhodiť do domáceho odpadu. Obal možno recyklovať.

Trvanlivosť: do dátumu uvedeného na obale

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užívania pomôcky ENTEROSGEL®, obráťte sa, prosím, e-mailom na: info@enterosgel.eu.

Táto písomná informácia je k dispozícii aj v iných jazykoch na www.enterosgel.eu.

VÝROBCA:



Bioline Products s.r.o.
Krakovská 1338/10
110 00 Praha, Česká
republika
www.enterosgel.eu

DISTRIBÚTOR:

NOE-centrum prevencie
a zdravia
Sebiriniho 21
821 03, Bratislava, Slovensko

DÁTUM AKTUALIZOVANEJ VERZIE PÍSOMNEJ INFORMÁCIE:

08.08.2022

WERSJA: TUV/IFU/SK/NB/2

VYSVETLENIE GRAFICKÝCH SYMBOLOV NA OBALE:

	Nepoužívajte opakovane.
	Minimálna trvanlivosť
	Šarža
	Výrobca
	Prosím, prečítajte si návod na použitie.
	Rozsah teplotného vymedzenia

CE 0123
Zdravotnícka pomôcka triedy IIa



ENTEROSGEL®

Αποτοξινωτικό παρασκεύασμα

Γαστροεντερικό εναιώρημα για χρήση σε οξεία διάρροια
και σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με διάρροια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

1. Τι είναι το ENTEROSGEL® και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το ENTEROSGEL®
3. Πώς να πάρετε το ENTEROSGEL®
4. Πίθανές παρενέργειες
5. Πώς να αποθηκεύσετε το ENTEROSGEL®
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και άλλες πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ENTEROSGEL® ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Το ENTEROSGEL® είναι πόσιμο εναιώρημα κατάλληλο για:

- τη συμπτωματική θεραπεία οξείας διάρροιας,
- το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με διάρροια (IBS-D).

Το ENTEROSGEL® είναι πόσιμο εντερικό προσροφητικό (enterosorbent). Είναι κατασκευασμένο στη βάση οργανικών υλικών με απορροφητικές ιδιότητες έναντι ορισμένων τοξικών και επιβλαβών ουσιών στο έντερο (π.χ. ενδοτοξίνες, εντεροπολινές), τις οποίες δεσμεύει στην επιφάνεια του μειώνοντας τη συχνότητα κενώσεων καθώς και τη διάρκεια της διάρροιας.

Το ENTEROSGEL® αποβάλλεται από το σώμα κατά τη διάρκεια της κένωσης και έτσι μαζί του αποβάλλονται οι προσροφημένες τοξικές και επιβλαβείς ουσίες, γεγονός που επιδρά ευεργετικά στη θεραπεία των ενδεικνυόμενων παθήσεων.

Το ENTEROSGEL® ανακούφιζε από τη διάρροια, τους κοιλιακούς πόνους, το φόυσκωμα και την ανάγκη για κένωση σε ασθενείς με IBS-D.

Το ENTEROSGEL® δεν περιέχει συντηρητικά, γλουτένη, ζάχαρη, γλυκαντικά, λακτόζη, λίπος, αρωματικές ουσίες, συστατικά φυτικής ή ζωικής προέλευσης.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ENTEROSGEL®

Μην χρησιμοποιείτε το ENTEROSGEL® (αντενδείξεις):

- Εάν λαμβάνετε ταυτόχρονα από το σόματος φάρμακο τροποποιημένης (ελεγχόμενης) αποδέσμευσης.
- Εάν πάσχετε από εντερική ατονία ή εντερική απόφραξη (σοβαρή δυσκολότητα λόγω εντερικής απόφραξης).
- Σε περιπτωτική δυσανεξία στο προϊόν κατά την προηγούμενη χρήση.

Προειδοποίησις και προφυλάξεις

- Μην πάρετε το ENTEROSGEL® λιγότερο από δύο ώρες πριν ή μετά τη λήψη φαρμάκων από το στόμα. Το ENTEROSGEL® μπορεί να επηρέασει την απορρόφηση ορισμένων φαρμάκων που χορηγούνται από το στόμα. Εάν λαμβάνετε φάρμακα, μπορεί επίσης να θέλετε να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποίο σας σχετικά με τη χρήση του ENTEROSGEL®.

- Σε περίπτωση παρατεταμένης διάρροιας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό πριν από τη λήψη του ENTEROSGEL® για να διαγνώσει την υποκείμενη κατάσταση.
- Στα παιδιά, η θεραπεία της διάρροιας θα πρέπει να συμπληρώνεται με τη χορήγηση επαρκών υγρών ή διαλύματος επανυδάτωσης από το στόμα για την πρόληψη της αφυδάτωσης.
- Στους ενήλικες, συνιστάται η λήψη υγρών ή διαλύματος επανυδάτωσης από το στόμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ENTEROSGEL® για να διασφαλιστεί η σωστή επανυδάτωση.
- Μην υπερβαίνετε τη συνιστάμενη διάρκεια θεραπείας και μην το παίρνετε μαζί με τροφή για να αποφύγετε πιθανή προσρόφηση βιταμινών ή θρεπτικών υστατικών.
- Εάν η διάρροια επιμένει για περισσότερες από δύο ημέρες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό.

- Εάν έχετε πυρετό, αίμα στα κόπρανα, σημάδια αφυδάτωσης, ή η περισσότερες κενώσεις τις τελευταίες 24 ώρες, διάρροια και εμετό ταυτόχρονα, έντονο ή συνεχές κοιλιακό άλγος, αναζητήστε ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατό, ειδικά εάν πρόκειται για παιδιά.
- Μην υπερβαίνετε τη συνιστάμενη δόση και μην υπερβαίνετε τη συνιστάμενη διάρκεια της θεραπείας.
- Παρακαλείστε να μιλήσετε με το γιατρό σας εάν λαμβάνετε επί του παρόντος άλλα εντερικά προσροφητικά, όπως προϊόντα που περιέχουν ενεργό άνθρακα, άργιλο ή καολίνη. Ο γιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει να μην τα παίρνετε ταυτόχρονα με το ENTEROSGEL®.
- Το ENTEROSGEL® δεν ενδείκνυται για χρήση σε περιπτώσεις οξείας χημικής δηλητηρίασης ή υπερδοσολογίας φαρμάκων.
- Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Το ENTEROSGEL® μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Συνιστάται να συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν δεν αισθάνεστε καλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε το ENTEROSGEL®.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ENTEROSGEL®

- Χρησιμοποιείστε την απαιτούμενη δόση ENTEROSGEL® μετά τα πρώτα αραία κόπρανα.
- Χρησιμοποιείστε το ENTEROSGEL® τουλάχιστον 2 ώρες πριν ή μετά τη λήψη φαρμάκων από το στόμα.
- Χρησιμοποιείστε το ENTEROSGEL® τουλάχιστον 1-2 ώρες πριν ή μετά το γεύμα.
- Αραίωστε τη δόση σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε το φακελάκι αμέσως μετά το άνοιγμα.
- Ανακινήστε καλά το σωληνάριο πριν το άνοιγμα και κάθε χρήση.
- Χρησιμοποιήστε το σωληνάριο εντός 30 ημερών από το άνοιγμα



Η διάρκεια θεραπείας με ENTEROSGEL® είναι:

- 3-5 ημέρες για οξεία διάρροια,
- Έως 30 ημέρες για σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με διάρροια. Το διάλειμμα μεταξύ της επαναλαμβάνομενης χρήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέρες.

- Συνιστάται να συμβουλευτείτε γιατρό πριν από τη χρήση σε παιδιά κάτω των τριών ετών.
- Μπορείτε να διπλασιάσετε την πρώτη δόση στην αρχή της θεραπείας (Ημέρα 1) και στη συνέχεια να συνεχίστε με μία δόση μετά από κάθε κένωση. Το πολύ οκτώ δόσεις την πρώτη ημέρα.
- Κατά τη διάρκεια της θεραπείας της χρόνιας διάρροιας, μπορείτε να προσαρμόσετε τη δοσολογία ανάλογα με τη σύσταση και τη συχνότητα των κενώσεων. Είναι δυνατό να λαμβάνετε διπλές δόσεις έως και 3 φορές την ημέρα εάν τα κόπρανα είναι αραιά, ή να μειώσετε σε μία δόση μία φορά την ημέρα εάν τα κόπρανα είναι φυσιολογικά. Μπορούν να ληφθούν το πολύ έξι δόσεις την ημέρα.
- Διακόψιμη θεραπεία με ENTEROSGEL® εάν δεν έχετε κενώσεις για 1-2 ημέρες, αυξήστε την πρόσληψη νερού και συνεχίστε τη θεραπεία μετά τις επόμενες κενώσεις.

Ηλικία	Δοσολογία	Συχνότητα
Έως 1 έτους	2,5 g (=1/2 κουταλάκι γλυκού)	3 φορές ημερησίως
	αραιώνυμε σε 7,5-15 ml νερού.	
1-6 ετών	5 g (= 1 κουταλάκι γλυκού) αραιώνυμε σε 50-100 ml νερού.	3 φορές ημερησίως
7-14 ετών	10 g (= 2 κουταλάκια γλυκού) αραιώνυμε σε 50-100 ml νερού.	3 φορές ημερησίως
15+ και ενήλικες	15 g ως 22,5 g (= 1 κουτάλι σούπας 1-1,5 σακουλάκι) αραιώνυμε σε 200 ml νερού.	3 φορές ημερησίως

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δυσκολιότητα, δυσανεξία (ναυτία)

5. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ENTEROSGEL®

- Το ENTEROSGEL® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε το ENTEROSGEL® σε θερμοκρασίες μεταξύ 4 °C και 30 °C.
- Προστατεύετε από το πάγωμα.
- Μην το εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως.
- Η διάρκεια ζωής που αναγράφεται στη συσκευασία αναφέρεται στο προϊόν που φυλάσσεται ουστά και δεν έχει ανοιχθεί.

Φακελάκια

- Κάθε φακελάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.
- Τα φακελάκια είναι μιας χρήσης και πρέπει να ανοίγονται αμέσως πριν από τη χρήση.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε μερικώς χρησιμοποιημένα φακελάκια για να αποφύγετε τη μικροβιακή μόλυνση.

Σωληνάρια

- Μετά το άνοιγμα και σε κάθε χρήση, κλείστε καλά το καπάκι του σωληναρίου για να αποφύγετε την έγρανση και τη μικροβιακή μόλυνση.

Ενδεχομένως να εμφανιστεί μια μικρή ποσότητα υγρού όταν πιέζετε το ENTEROSGEL® από το σωληνάριο ή το φακελάκι.

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συστατικά: Πολυυδρική πολυμεθυλοσιλοξάνη (υδρογέλη μεθυλοπυριτικού οξείου) - 70%, Αποστειρωμένο νερό - 30 %.

Μεγέθη συσκευασίας

ENTEROSGEL® στοματικό εναιώρημα

- Σωλήνας 225 g
- Σωλήνας 90 g
- Φακελάκι 15 g (10 φακελάκια ανά συσκευασία)

ΑΠΟΣΥΡΨΗ

Δεν ισχύουν ειδικά μέτρα για την απόσυρση του αρχηγομοποιήτου ENTEROSGEL®. Το προϊόν μπορεί να απορριφθεί με ασφάλεια στον κάδο απορριμμάτων. Η συσκευασία μπορεί να ανακυκλωθεί.

Διάρκεια ζωής: μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του ENTEROSGEL®, επικοινωνήστε με το: info@enterosgel.eu.

Αυτό το φυλλάδιο διατίθεται επίσης σε άλλες γλώσσες στη διεύθυνση www.enterosgel.eu.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣΑΣ:

Dr. Stanislava

Bioline Products s.r.o.
Královská 1338/10,
110 00 Praha, Τσεχική Δημοκρατία
www.enterosgel.eu

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ:

08.08.2022

ΣΕΙΡΑ:

TUV/IFU/CY/NB/2

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Μην επαναχρησιμοποιείτε

Πιστοποιημένη ιατρική συσκευή

Ελάχιστη διάρκεια ζωής

Συσκευασία μίας χρήσης

Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη συσκευασία στον κατάλληλο ΚΑΔΟ απορριμμάτων. Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη

Για τη συσκευασία αυτή έχει καταβληθεί αμοιβή σε εξουσιοδοτημένη εταιρεία συσκευασίας.

Κατασκευαστής

Για τη συσκευασία αυτή έχει καταβληθεί αμοιβή σε εξουσιοδοτημένη εταιρεία συσκευασίας.

Διαβάστε τις οδηγίες

Κρατήστε το μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία

Εύρος θερμοκρασίας

CE 0123

Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορία IIa

EST Seedetrakti adsorbent kasutamiseks ägeda köhulahtisuse ja köhulahtisega ärritatud soole sündroomi korral

MIDA SEE PAKENDI INFOLEHT SISALDAB

1. Mis on ENTEROSGEL® ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne ENTEROSGEL®'i võtmist
3. Kuidas ENTEROSGEL®'i võtta
4. Võimalikud körvaltoimed
5. Kuidas ENTEROSGEL®'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS ON ENTEROSGEL® JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

ENTEROSGEL® on suukaudne suspensioon, mis on näidustatud:

- ägeda köhulahtisuse sümpтомаатiliseks raviks;
- tarvitamiseks köhulahtisusega ärritatud soole sündroomi (IBS-D) korral.

ENTEROSGEL® on mõningaid sooles leiduvaid toksilisi ja kahjulikke aineid (näiteks endotoksiinide ja enterotoksiinide) adsorbeeriva orgaanilise mineraali baasil valmistatud suukaudne intestinaalne adsorbent (enterosorbent). Orgaaniline mineraal seob need ained füüsilselt oma pinnaga ning vähendab roojamise sagedust ja lühendab köhulahtisuse kestust.

ENTEROSGEL® väljub kehast koos roojaga ning eemaldab nii adsorbeeritud toksiiniid ja kahjulikud ained, mis võib näidustatud seisundite ravimisel soodsat toimet avaldada.

ENTEROSGEL® leevedab IBS-D all kannatavatel patsientidel köhulahtisust, köhulaval, puhitust ja roojamistungi.

ENTEROSGEL® ei sisalda säilitusaineid, gluteeni, suhkrut, magusaineid, lakktoosi, rasvu, maitseaineid ega taimset või loomset päritolu koostisosid.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ENTEROSGEL®'I VÖTMIST

Ärge tarvitage ENTEROSGEL®'i (vastunäidustused):

- kui te tarvitate samaaegselt toimeaine modifitseeritud (juhitava) vabanemisega suukaudseid ravimeid;
- kui te kannatate sooleatoonia või soolte ummistuse (soolesulguse põhjustatud ägeda köhukinnisuse) all;
- kui teil on preparaadi varasemal kasutamisel esinenud selle suhtes talumust.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- Ärge tarvitage ENTEROSGEL®'i vähem kui kaks tundi enne või pärast mõne suukaudse ravimi tarvitamist. ENTEROSGEL® võib möjutada osade suu-

kaudselt manustatavate ravimite imendumist. Kui te tarvitate mingeid ravimeid, võite preparaadi ENTEROSGEL® kasutamise üle ka oma arsti või apteekriga nõu pidada.

- Kaua kestva köhulahtisuse korral tuleb enne preparaadi ENTEROSGEL® tarvitamist pidada nõu arstiga, et määrate kindlaks põhihaiguse diagnoos.
- Lastele tuleb köhulahtisuse ravimisel veekaotuse vältimeks anda juua piisavalt vedelikku või suukaudset rehüdreerimislahust.
- Täiskasvanutel soovitatakse preparaadija ENTEROSGEL® ravimise ajal juua vedelikku või suukaudset rehüdreerimislahust, et tagada veekaotuse piisav korvamine.
- Ärge ületage soovitatud ravi kestust ega tarvitage preparaati koos toiduga, et vältida võimalikku vitamiinide või toitainete adsorptsiooni.
- Kui köhulahtisust kestab kauem kui kaks päeva, tuleb pidada nõu arstiga.
- Kui esineb palavik, veri roojas, veekaotuse sümpomid, kuus või enam roojamist viimase 24 tunni jooksul, korraga nii köhulahtisust kui ka oksendamine, tugevad või pidevad köhulavalud, pöörduge võimalikult kiiresti arsti poolle, eriti kui tegu on lastega.
- Ärge ületage soovitatud annust ega soovitatud ravi kestust.
- Kui te tarvitate muid intestinaalseid adsorbente, näiteks aktiivsütt, savi või kaoliini sisaldavaid preparaate, pidage nõu oma arstiga. Arst võib teil soovitada mitte tarvitada neid koos preparaadija ENTEROSGEL®.
- ENTEROSGEL® ei ole näidustatud tarvitamiseks kemikaalide põhjustatud ägeda mürgistuse või ravimite üleannustamise korral.
- Ärge kasutage pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja möödumist.

ENTEROSGEL®'i võib tarvitada raseduse ja imetamise ajal. Kui te tunnete end raseduse või imetamise ajal halvasti, soovitame pidada nõu oma arstiga. Palun pidage enne preparaadi ENTEROSGEL® tarvitamist nõu oma arstiga.

3. KUIDAS ENTEROSGEL®'I VÖTTA

- Võtke vajalik annus preparaati ENTEROSGEL® pärast esimest vedela rooja väljutamist.
- Tarvitage ENTEROSGEL®'i vähemalt 2 tundi enne või pärast mõne suukaudse ravimi tarvitamist.
- Tarvitage ENTEROSGEL®'i vähemalt 1–2 tundi enne või pärast söömist.
- Enne manustamist lahjendage annus toatemperatuuril oléva veega.
- Kasutage pakikese sisu ära kohe pärast avamist.
- Enne tuubi avamist ja iga kasutuskorda loksutage seda hoolikalt.
- Kasutage tuubi sisu ära 30 päeva jooksul pärast avamist.



Vanus	Annustamine	Kui sageli
Kuni 1 aasta	2,5 g (u 1/2 teelusikatäit) lahjendada 7,5–15 ml veega.	3 korda päevas
1–6 aastat	5 g (u 1 teelusikatäis) lahjendada 50–100 ml veega.	3 korda päevas
7–14 aastat	10 g (u 2 teelusikatäit) lahjendada 50–100 ml veega.	3 korda päevas
15+ ja täiskasvanud	15–22,5 g (u 1 supilusikatäis või 1–1,5 pakkest) lahjendada 200 ml veega.	3 korda päevas

Preparaadija ENTEROSGEL® ravimise kestus on

- 3–5 päeva ägeda köhulahtisuse korral;
- Kuni 30 päeva köhulahtisusega ärritatud soole sündroomi korral. Korduva kasutamise vaheline paus peaks olema vähemalt 3 päeva.
- Enne manustamist kuni 3-aastastele lastele soovitame pidada nõu arstiga.
- Ravi alguses (1. päeval) võite esimese annuse kahekordistada ning seejärel jätkata ühekordsete annuste tarvitamist iga kord pärast roojamist. Esimesel päeval võib vötta kuni kaheksa annust.
- Kroonilise köhulahtisuse ravimisel võite annustamist muuta nii, et see vastab rooja konsistentsile ja roojamise sagedusele. Kui roe on vedel, võib tarvitada kuni 3 korda päevas kahekordse annuse, kui aga roe on normaalne, siis võib vötta vaid ühe annuse 1 kord päevas. Maksimaalselt võib tarvitada kuus annust päevas.
- Katkestage ravi ENTEROSGEL®'iga, kui 1–2 päeva ei ole roojamist esinenud. Jooge rohkem vett ja jätkake ravi pärast järgmist roojamist.

4. VÕIMALIKUD KÖRVALTOIMED

Köhukinnisus, iiveldus

5. KUIDAS ENTEROSGEL®'I SÄILITADA

- ENTEROSGEL®'i ei tohi pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja möödumist tarvitada.
- Hoidke lastele kättesaadamus kohas.
- Säilitage ENTEROSGEL®'i temperatuuril 4 °C kuni 30 °C.
- Vältige külümist.
- Ärge hoidke liiga soojas kohas ega otsese päikesepaiste käes.
- Pakendile märgitud kõlblikkusaja kehtib nõuetekohaselt säilitatud avamata toote kohta.

Pakikesed

- Pärast avamist võib iga pakikest kasutada ainult ühe korra.
- Pakikesed on möeldud ühekordseks kasutamiseks ja need tuleb avada vahelt enne tarvitamist.
- Mikroobisaaste vältimeks ärge tarvitage osaliselt tarvitatud pakikesi koruvalt.

Tuubid

- Pärast avamist ja iga kasutamist sulgege tuubi kork korralikult, et vältida sisu kuivamist ja mikroobisaastet.

Preparaadija ENTEROSGEL® tuubist või pakikesest välja pigistamisel võib väljuda vähene kogus vedeliku.

6. PAKENDI SISU JA MUU TEAVE

Koostis: polümetüüsiloksaanpolühhüdraat (metüüranihappe hüdrogeel) – 70%; puhasstatud vesi – 30%.

Pakendi suurus

ENTEROSGEL® suukaudne suspensioon
– 225 g tuub
– 90 g tuub
– 15 g pakike (pakendis 10 pakikest)

KÖRVALDAMINE

Kasutamata preparaadi ENTEROSGEL® körvaldamisel ei rakendata mingeid erimeetmeid. Preparaadi võib visata olmejäätmete hulka. Pakend on ümbertöötatav.

Kõlblikkusaga: kuni pakendile märgitud kuupäevani

Kui teil on preparaadi ENTEROSGEL® tarvitamise kohta küsimusi, võtke palun ühendust e-posti aadressil info@enterosgel.eu.

Veebisaidil www.enterosgel.eu on see pakendi infoleht saadaval ka teistes keeltes.

PAKENDIL OLEVATE GRAAFILISTE SÜMBOLITE TÄHENDUSED



Ärge kasutage korduvalt



Sertifitseeritud meditsiiniseade




Parim enne



Ühekorrakond

LOT


Partii



Kasutatud pakend asetage vatasvasse jäätmenöösse. Pakend on ümbertöödeldav



Tootja



Selle pakendi eest on makstud tasu volitatud pakendifirmale



Lugege kasutusjuhendit



Temperatuurivahemik
4°C – 30°C

MANUFACTURER:



Bioline Products s.r.o.
Krakovská 1338/10,
110 00 Praha, Tsekhi Vabariik
www.enterosgel.eu

PAKENDI INFOLEHE UUENDATUD VERSIOONI KUUPÄEV:

08.08.2022

VERSIOON:

TUV/IFU/EST/NB/2

LEVITAJA EESTIS:



Pae 8, 11414, Tallinn
info@paira.ee

CE 0123
Meditsiiniseade klass IIa



Gastrointestinālais adsorbents lietošanai akūtās caurejas un kairinātās zarnas sindroma ar caureju gadījumā

KAS ATRODAS ŠAJĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJĀ

1. Kas ir ENTEROSGEL® un kam to izmanto
2. Kas Jums jāzina, pirms sākset lietot ENTEROSGEL®
3. Kā lieto ENTEROSGEL®
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt ENTEROSGEL®
6. Iepakojuma saturus un citā informāciju

1. KAS IR ENTEROSGEL® UN KAM TO IZMANTO

ENTEROSGEL® ir perorāla suspensija, kas indikēta:

- simptomātiskai akūtas caurejās ārstēšanai,
- caurejas, kas saistīta ar kairinātās zarnas sindromu (IBS-D), ārstēšanai.

ENTEROSGEL® ir perorāls zarnu adsorbents (enterosorbents). Tas ir izgatavots uz organiska minerāla bāzes ar dažu toksisku un kaitīgu vielu (piem., endotoksiņu, enterotoksiņiem) adsorbējās spējām zarnās, šādi fiziski tos saistot uz savas vīrsmas un samazinot vēdera iezjas biezumu un caurejas ilgumu.

ENTEROSGEL® no organismā izdalās ar izkārniņumiem un šādi izvada adsorbēto toksīnu un kaitīgo vielu, kam var būt laba ieteikme, ārstējot indikētos stāvokļus.

ENTEROSGEL® mazina caureju, vēdergraežas, vēdera uzpūšanas un nepieciešamību izkārniņu pacientiem ar IBS-D.

ENTEROSGEL® nesatur konservantus, glutēnu, cukuru, saldinātajus, laktazi, taukus, aromatizētajus, augu vai dzīvnieku izcelmes sastāvdajās.

2. KAM JUMS JĀZINA, PIRMS SĀKSET LIETOT ENTEROSGEL®

Nelietojiet ENTEROSGEL® (kontraindikācijas):

- Ja vienlaikus lietojot perorālas zāles ar modifikuētu (kontro-lētu) atbrivošanos.
- Ja slimojat ar zarnu atoniju vai zarnu nosprostojumu (smags aizcietējums zarnu obstrukcijas dēļ).
- Lidzekļa nepanesamības gadījumā, kas atklājusies, to lie-tojot pagātnē.

Brīdinājumi un paziņojumi

- Nelietojiet ENTEROSGEL® Mazāk nekā divas stundas pirms vai pēc perorālu zāļu lietošanas. ENTEROSGEL® var ieteiktēt dažu perorāli lietojamu zāļu absorbējumu. Ja lietojat citās zāles, varat apspriest lidzekļa ENTEROSGEL® lietošanu ar savu ārstu vai farmaceitu.
- Ilgtosīs caurejas gadījumā pirms ENTEROSGEL® lietošanas ieteicams apspriest ar ārstu, lai noteiktu pamatlīmības diagnozi.
- Bēriņi caurejas ārstēšanā jāpaplīdina ar savalcīgu pie-kāma šķidruma daudzuma pasniegšanu, ja nepieciešams, jāpāsniez perorāls rehidratācijas šķidums, lai izvairītos no organismā atūdeņošanās.
- Pieaugušām personām laikā, kamēr tās ārstējas ar lidzekļu ENTEROSGEL®, ieteicams uzņemt šķidrumu vai perorālu

rehidratācijas šķidumu, lai nodrošinātu pietiekamu rehidratāciju.

- Nepārsniedziet ieteikto ārstēšanas laiku un nelietojiet vienlaikus ar ārstu, lai izvairītos no iespējamās vitamīnu vai uzturvielu adsorbējās.
- Ja caureja ilgst ilgāk par divām dienām, nepieciešama ārsta konsultācija.
- Ja Jums ir karsonis, asinis izkārniņumos, atūdeņošanas pazi-mes, sešas vai vairāk vēdera iezjas pēdējo 24 stundu laikā, vienlaikus caureja un vēršanā, spēcīgas vai neparejošas vēdergraežas, vispirms meklējiet medicīnisku palīdzību, it īpaši bēru gadījumā.
- Nepārsniedziet ieteikto devu un nepārsniedziet ieteikto ārstēšanas laiku.
- Lūdzu, apspriedieties ar savu ārstu, ja vienlaikus lietojat arī citus zarnu adsorbenti, piemēram, lidzekļus, kas satur aktīvo oglu, mālūs vai kaolinu. Ir iespējams, ka ārsts Jums ieteiks, lai Jūs tos nelietojat kopā ar lidzekļu ENTEROSGEL®.
- ENTEROSGEL® nav indikēts lietošanai akūtās kīmiskās sain-dēšanas vai lidzekļa pārdozēšanas gadījumā.
- Nelietojiet pēc deriguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

ENTEROSGEL® ir atlauts lietot grūtniečibas laikā un zi-dišanas periodā. ieteicams apspriesties ar savu ārstu, ja grūtniečibas laikā vai zi-dišanas periodā nejutaties labi. Pirms lidzekļa ENTEROSGEL® lietošanas, lūdzu, apspriedieties ar savu ārstu.

3. KĀ LIETO ENTEROSGEL®

Lietojiet nepieciešamo lidzekļa ENTEROSGEL® devu pēc pirmās šķidrās vēdera iezjas.

Lietojiet ENTEROSGEL® minimāli 2 stundas pirms vai pēc perorālu zāļu lietošanas.

Lietojiet ENTEROSGEL® minimāli 1-2 stundas pirms vai pēc ēšanas.

Pirms lietošanas atšķaidiet devu istabas tem-peraturenās.

Paciņa jāzīmētuzreiz pēc atvēršanas.

Tūbiņu labi sakriti pirms atvēršanas un pēc katra lietošanas.

* Tūbiņu izlietojiet 30 dienu laikā pēc atvēr-šanas.

ENTEROSGEL® mazina caureju, vēdergraežas, vēdera uzpūšanas un nepieciešamību izkārniņu pacientiem ar IBS-D.

ENTEROSGEL® nesatur konservantus, glutēnu, cukuru, saldinātajus, laktazi, taukus, aromatizētajus, augu vai dzīvnieku izcelmes sastāvdajās.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Aizcietējums, nelabums (slikta dūša)

Ārstēšanās ar lidzekļu ENTEROSGEL® laiks ir:

- 3-5 dienas akūtas caurejas gadījumā,
- Lidz 30 dienām kairinātās zarnas sindroma ar caureju gadījumā. Pārtraukumam starp atkārtotu lietošanu jābūt vismaz 3 dienām.
- Pirms lietošanas bērniem lidz trīs gadu vecumam, ieteicams apspriesties ar ārstu.
- Ārstēšanas sākumā (1. diena) Jūs varat dubultot pirmo devu un pēc tam turpināt lietot vienu devu pēc katras vēdera iezjas. Pirmajā dienā – maksimāli astoņas devas.
- Ārstējot hronisku caureju, varat norēgēt devu tā, lai tā atbilstu izkārniņumu konsistencī un vēdera iezjas biezumam. Ja izkārniņumi ir šķidri, ir iespējams lietot dubultu devu pat 3 reizes dienā, vai arī samazināt lidz 1 devai dienā, ja vēdera iezja ir normala. Maksimāli ar ENTEROSGEL®, ja 1-2 dienas neiziet vēders, dzeriet vairāk ūdens un turpiniet ārstēšanos pēc nā-kamas vēdera iezjas.

5. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

UZ IEPAKOJUMA ESOŠO GRAFIKO SIMBOLU SKAIĐRO-JUMS:

Šī lietošanas instrukcija ir preejama arī citās valodās www.enterosgel.eu vietnē.

RAŽOTĀJS:

Bioline Products s.r.o.
Krajkovská 1338/10,
11 00 Praga, Čehijas Republika
www.enterosgel.eu



PILNVAROTĀS PĀRSTĀVIĀS LATVIJĀ:

SIA INTROMED
REG. NR. 4013770750
inga.zalamane@inbox.lv
Tāl. + 371 26449608

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS AKTUALIZĒTĀS VERSIJAS DA-TUMS: 08.08.2022

VERSIE: TUV/IFU/LV/NB/2



Detoxifying agent

Gastrointestinal adsorbent for use in Acute Diarrhoea and Irritable bowel syndrome with diarrhoea

WHAT IS IN THIS LEAFLET

- 1.What is ENTEROSGEL® and what it is used for
- 2.What you need to know before you take ENTEROSGEL®
- 3.How to take ENTEROSGEL®
- 4.Possible side effects
- 5.How to store ENTEROSGEL®
- 6.Content of the pack and other information

1. WHAT IS ENTEROSGEL® AND WHAT IT IS USED FOR

ENTEROSGEL® is an oral suspension indicated for the:

- Symptomatic treatment of acute diarrhoea
- Treatment of Irritable bowel syndrome with diarrhoea (IBS-D).

ENTEROSGEL® is an oral intestinal adsorbent (enterosorbent) based on organic mineral with adsorption capacity towards some toxic and harmful substances in the gut (e.g., endotoxins, entero-toxins), physically binding them to its surface, reducing stool frequency and duration of diarrhoea.

ENTEROSGEL® is expelled from the body with the stool, this way eliminating the adsorbed toxins and harmful sub-stances, which can be beneficial for treatment of indicated conditions.

ENTEROSGEL® relieves symptoms of diarrhoea, abdominal pain, bloating and urgency in IBS-D patients.

ENTEROSGEL® is free from preservatives, gluten, sugar, sweeteners, lactose, fat, flavours, colouring, plant or animal-derived ingredients.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE ENTEROSGEL®

DO NOT USE ENTEROSGEL® if (contraindications):

- you are currently taking modified-release orally adminis-trated medications;
- you have intestinal atony or intestinal blockage (sever consti-pation due to bowel obstruction);
- you have intolerance based on prior use of ENTEROSGEL®.

Precautions

- Do not use ENTEROSGEL® within 2 hours before or after taking oral medication. ENTEROSGEL® may affect the ab-sorption of some medicines that are administered orally. If you are taking any medication, you may wish to con-sult with your doctor or pharmacist regarding taking EN-TEROSGEL®.
- In case of long-term diarrhoea you should consult a doctor to obtain a diagnosis of the underlying condition before taking ENTEROSGEL®.
- In children, treatment of diarrhoea should be accom-pañied by plenty of fluids which may include an oral rehydra-tion solution (ORS) to avoid dehydration.
- In adults, it is advisable to consume water or an ORS during the treatment with ENTEROSGEL® to assure proper hydration.



3. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Izspiežot ENTEROSGEL® no tūbiņas vai paciņas, var parādīties neliels daudzums šķidruma.

6. IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Sastāvs: Polimētīloskāns polihidrāts (metilsilicījskābes hid-roglēls) – 70 %, attīrtis ūdens – 30 %.

IEPAKOJUMA IZMĒRI


ENTEROSGEL® perorāla suspensija bez garšas
– Tūbiņa 225 g
– Tūbiņa 90 g
– Paciņa 15 g (10 paciņas iepakojumā)

LIKVIDĒŠANA


Uz lietojotu lidzekļu ENTEROSGEL® likvidēšanu neattiecas ne-kādi ipaši pasākumi. Lidzekļi atlauts droši izmest mājsaimniecības atkritumos. iepakojumu ir iespējams ortreiz pārstrādāt.

Deriguma termins: lidz datumam, kas norādīts uz iepakojuma

Ja Jums radušies papildu jautājumi par lidzekļu ENTEROS-GEL® lietošanu, lūdzu, rakstiet uz: info@enterosgel.eu.



Temperatūras diapazons



Lūdzu, izlasiet instrukciju



Uzglabāt vietā, kur nav tiešu saules staru iedarbības.

Age	Dosage	How Often
Under 1 year	2,5g (≈ 1/2 teaspoon) diluted in 7,5-15ml of water.	3 times a day
1-6 years old	5g (≈ 1 teaspoon) diluted in 50-100ml of water.	3 times a day
7-14 years old	10g (≈ 2 teaspoons) diluted in 50-100ml of water.	3 times a day
15+ and adults	15g to 22,5g (≈ 1 table-spoon or 1-1,5 sachet) diluted in 200ml of water.	3 times a day

CE 0123
Medicinas ierice klase IIa

Duration of the treatment with ENTEROSGEL® is:

- 3-5 days for acute diarrhoea
- Up to 30 days for IBS-D. Break between repeated use should be at least 3 days.
- Prior the use in children under 3 years old is advisable to consult a doctor.
- In the beginning of the treatment (on day 1) you can double the first dose and then continue with a single dose after each bowel movement. Maximum 8 doses on the first day.
- During treatment of chronic diarrhoea, you may adjust your dosage to suit your stool consistency and bowel movements. You can increase treatment to double dose up to 3 times a day if your stool is loose, or reduce to a single dose once a day if your stool is normal. Maximum 6 doses per day.
- Stop the treatment with ENTEROSGEL® if you do not have bowel movement for 1-2 days, increase intake of water and continue the treatment after the next bowel movement.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Constipation, nausea

5. HOW TO STORE ENTEROSGEL®

- ENTEROSGEL® should not be used after the expiry date on the package.
- Keep out of reach of children.
- Store ENTEROSGEL® at temperature between 4 °C and 30 °C.
- Do not freeze.
- Keep away from direct sunlight and heat.
- The expiration date on the package refers to when the product is unopened and when properly stored.

For sachets

- Each sachet should be used only once after it is opened.
- Each sachet is disposable and should be opened immediately before use.
- Do not reuse partially used sachets to prevent microbial contamination.

For tubes

- Close the lid of the tube tightly after opening and after each use to avoid drying and to prevent microbial contamination.

When squeezing ENTEROSGEL® out of the tube or a sachet some amount of liquid may appear.

6. CONTENT OF THE PACK AND OTHER INFORMATION

Composition: Polymethylsiloxane polyhydrate (methylsilicic acid hydrogel) – 70%, purified water – 30%.

Package size

- ENTEROSGEL® oral suspension
– Tube 225 g
– Tube 90 g
– Sachet 15 g (10 sachets per pack)

DISPOSAL

There are no special disposal requirements for unused ENTEROSGEL®. It can be safely disposed into the domestic waste. Packaging can be recycled.

Shelf life: Until dated indicated on package

If you have any further questions about use of ENTEROSGEL® please email: info@enterosgel.eu.

This instructions for use leaflet (IFU) is also available in other languages at www.enterosgel.eu.

MANUFACTURER:
Bioline Products s.r.o.
Královská 1338/10,
110 00 Prague, Czech Republic
www.enterosgel.eu



DISTRIBUTOR :


SIA INTROMED
REG. NR. 40103770750
inga.zalamane@inbox.lv
Tālr. + 371 26449608

LEAFLET DATE OF UPDATED ISSUE: 08.08.2022

VERSION: TUV/IFU/LV/NB/2



Адорсорбирующий препарат



Желудочно-кишечный адсорбент для применения при острой диарее и синдроме раздраженного кишечника с диареей

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША К ПРЕПАРАТУ

1. Что такое ЭНТЕРОСГЕЛЬ® и для чего он применяется
2. Что нужно знать, прежде чем принимать ЭНТЕРОСГЕЛЬ®
3. Как принимать ЭНТЕРОСГЕЛЬ®
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить ЭНТЕРОСГЕЛЬ®
6. Содержимое упаковки и другая информация

1. ЧТО ТАКОЕ ЭНТЕРОСГЕЛЬ® И ДЛЯ ЧЕГО ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

ЭНТЕРОСГЕЛЬ® представляет собой пероральную суспензию, предназначенную для:

- симптоматического лечения острых диарейных заболеваний,
- синдрома раздраженного кишечника с диареей (СРК-Д).

ЭНТЕРОСГЕЛЬ® - пероральный кишечный адсорбент (энтросорбент) на основе органического минерала, обладающего способностью адсорбировать некоторые токсичные и вредные вещества в кишечнике (например, эндотоксины, энтеротоксины), и физически связывать их на своей поверхности, таким образом, снижая частоту дефекации и продолжительность диареи.

ЭНТЕРОСГЕЛЬ® выводится из организма вместе с калом, тем самым удаляя адсорбированные токсичные и вредные вещества, что оказывает благоприятное воздействие на купирование проявлений диареи и синдрома раздраженного кишечника с диареей.

ЭНТЕРОСГЕЛЬ® облегчает и купирует проявления диареи, боли и спазмов живота, вздутия, уменьшает позывы к дефекации у пациентов с СРК-Д.

ЭНТЕРОСГЕЛЬ® не содержит консервантов, глютена, сахара, подсластителей, лактозы, жиров, ароматизаторов, ингредиентов растительного и животного происхождения.

2. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ПРЕДЬЕМЕЧЕМ ПРИНИМАТЬ ЭНТЕРОСГЕЛЬ®

Не используйте ЭНТЕРОСГЕЛЬ® в следующих случаях (противопоказания):

- Если вы одновременно принимаете пероральные препараты с модифицированным (контролируемым) высвобождением.
- Если вы страдаете атонией кишечника или кишечной непроходимостью (сильные запоры из-за непроходимости кишечника).
- В случае непереносимости продукта при употреблении в прошлом.

Предупреждения и меры предосторожности

- Не принимайте ЭНТЕРОСГЕЛЬ® менее чем за два часа до или после приема пероральных лекарств. ЭНТЕРОСГЕЛЬ® может влиять на всасывание таких препаратов. В этом случае перед приемом ЭНТЕРОСГЕЛЬ® рекомендуем проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
- В случае длительной диареи перед приемом ЭНТЕРОСГЕЛЬ® необходимо проконсультироваться с врачом для установления диагноза основного заболевания.

Продолжительность лечения препаратом ЭНТЕРОСГЕЛЬ® составляет:

- 3-5 дней при острой диарее,
- До 30 дней при синдроме раздраженного кишечника с диареей. Перерыв между повторным применением должен быть не менее 3 дней.
- Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед применением детям в возрасте до 3-х лет.
- В начале лечения (1-й день) можно удвоить первую дозу, а затем продолжать принимать по одной дозе после каждого акта дефекации. Максимум - восемь доз в первый день.
- При лечении хронической диареи можно регулировать дозировку в зависимости от консистенции и частоты стула. Можно принимать двойной дозу до 3 раз в день, если стул жидкий, или уменьшить до одной дозы 1 раз в день, если стул в норме. В день можно принимать не более шести доз.
- Прекратите лечение ЭНТЕРОСГЕЛЬ®, если у вас нет опорожнения кишечника в течение 1-2 дней, увеличьте потребление воды и возобновите лечение после следующего опорожнения кишечника.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Запор, плохое самочувствие (тошнота).

5. КАК ХРАНИТЬ ЭНТЕРОСГЕЛЬ®

• ЭНТЕРОСГЕЛЬ® нельзя использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Хранить при температуре от 4°C до 30°C.
- Беречь от мороза.
- Не подвергать чрезмерному нагреванию и воздействию прямого солнечного света.
- Срок годности, указанный на упаковке, относится к препарату, хранящемуся надлежащим образом без вскрытия, непосредственно до его применения.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ ЭНТЕРОСГЕЛЬ®

• Примите необходимую дозу ЭНТЕРОСГЕЛЬ® после первого жидкого стула.

• Принимайте ЭНТЕРОСГЕЛЬ® не менее чем за 2 часа до или после приема пероральных лекарств.

• Принимайте ЭНТЕРОСГЕЛЬ® не менее чем за 1-2 часа до или после еды.

• Перед приемом разведите дозу в воде комнатной температуры.

• Используйте саше целиком сразу после вскрытия.

• Тщательно встрахивайте тюбик перед открытием и после каждого использования.

• Используйте тюбик в течение 30 дней после первого вскрытия.

Возраст

Дозировка

Периодичность приема

До 1 года	2,5 г (=1/2 чайной ложки) развести в 7,5-15 мл воды.	3 раза в день
1-6 лет	5 г (= 1 чайная ложка) развести в 50-100 мл воды.	3 раза в день
7-14 лет	10 г (= 2 чайные ложки) развести в 50-100 мл воды.	3 раза в день
15+ и взрослые	От 15 г до 22,5 г (= 1 столовая ложка или 1-1,5 пакета) развести в 200 мл воды.	3 раза в день

Срок годности: годен до даты, указанной на упаковке.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно использования ЭНТЕРОСГЕЛЬ®, вы можете связаться с нами по электронной почте: info@enterosgel.eu.

Данный листок-кладыш также доступен на других языках на сайте www.enterosgel.eu.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Bioline Products s.r.o.
Královská 1338/10,
110 00 Praha
Чешская Республика
www.enterosgel.eu

ДИСТРИБЮТОР В ЛАТИИ:

SIA INTROMED
REG. NR. 40103770750
inga.zalamane@inbox.lv
Tālr. + 371 26449608

ДАТА ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИИ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША:

08.08.2022

ВЕРСИЯ:

TUV/IFU/LV/NB/2

ПОЯСНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ НА УПАКОВКЕ:

	Не используйте повторно
	Сертифицированное медицинское изделие
	Минимальный срок хранения
	Одноразовая упаковка
	Использованную упаковку помещают в соответствующий контейнер для отходов.
	Производитель
	Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией
	За эту упаковку была внесена плата уполномоченной упаковочной компании.
	Не допускайте попадания прямых солнечных лучей
	Диапазон температур





WAT IS DE INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER

- Wat is ENTEROSGEL® en waarvoor wordt het gebruikt?
- Waar u aan moet denken voordat u ENTEROSGEL® gaat gebruiken
- Hoe wordt ENTEROSGEL® gebruikt
- Mogelijke bijwerkingen
- Hoe wordt ENTEROSGEL® bewaard
- Inhoud van het pakket en andere informatie

1. WAT IS ENTEROSGEL® EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

ENTEROSGEL® is een orale suspensie geïndiceerd bij:

- symptomatische behandeling van acute met diarree gepaard gaande ziekten,**
- het prikkelbare darm syndroom met diarree (IBS-D).**

ENTEROSGEL® is een oraal darmadsorbent (enterosorbent) op basis van organisch mineralen met adsorptievermogen voor deze toxicische en schadelijke stoffen in de darm (bijv. endotoxinen, enterotoxinen), die deze fysiek bindt op zijn oppervlakte en op deze manier de frequentie van de stoelgang en de duur van de diarree verlaagt.

ENTEROSGEL® verlaat het lichaam, met de opgenomen toxinen en schadelijke stoffen, wat een weldadig effect kan hebben bij de behandeling van geïndiceerde condities.

ENTEROSGEL® verlicht diarree, buikpijn, winderigheid en aandrang tot ontlasting bij patiënten met IBS-D.

ENTEROSGEL® bevat geen conserveringsmiddelen en kleurstoffen, is glutenvrij, vetvrij, zoetstofvrij, lactosevrij, smaakstofvrij en vrij van ingrediënten van plantaardige of dierlijke oorsprong.

2. WAAR U AAN MOET DENKEN VOORDAT U ENTEROSGEL® GAAT GEBRUIKEN

Gebruik ENTEROSGEL® niet (contra-indicaties):

- als u tegelijkertijd geneesmiddelen gebruikt met een ge-modificeerde (gecontroleerde) afgrift.
- Als u lijdt aan intestinale atonie of darmobstructie (ernstige constipatie als gevolg van darmobstructie).
- in geval van intolerantie voor het product tijdens gebruik in het verleden.

Waarschuwing en maatregelen

Gebruik ENTEROSGEL® niet minder dan twee uur voor het gebruik of na het gebruik van een oraal geneesmiddel. ENTEROSGEL® kan de absorptie van sommige medicijnen beïnvloeden die oraal worden toegepast. Indien u medicijnen gebruikt, kunt u over ENTEROSGEL® advies inwinnen bij uw huisarts of apotheker.

In het geval van langdurige diarree, is het noodzakelijk om voorafgaand aan het gebruik van ENTEROSGEL® een arts te raadplegen tenzijne de onderliggende ziekte te diagnosticeren.

Bij kinderen moet de behandeling van diarree worden aangevuld met tijdelijke toediening van een voldoende

hoeveelheid vloeistof, eventueel een orale rehydratatieoplossing, om dehydratie (uitdroging) te voorkomen. • Bij volwassenen wordt aanbevolen om gedurende de behandeling met ENTEROSGEL® voldoende extra vloeistoffen te nuttigen tenzijne voldoende hydratie te bevorderen.

Overschrijd niet de aanbevolen behandelingstijd en gebruik het geneesmiddel niet samen met voedsel om een mogelijk vitamine- of nutriëntenabsorptie te vermijden.

Als diarree langer dan twee dagen duurt, is het noodzakelijk een arts te raadplegen.

Bij koorts, bloed in de ontlasting, tekenen van dehydratie (uitdroging), zes of meer ontlastingen gedurende de afgelopen 24 uur, diarree en braken, ernstige of permanente buikpijn dient u zo snel mogelijk medische hulp te zoeken - vooral als het gaat om kinderen.

Overschrijd zowel de aanbevolen dosering als de behandelduur niet.

Raadpleeg uw arts, als u momenteel andere intestinale adsorbentia gebruikt, zoals preparaten die actieve kool, klei of kaolienen bevatten. Uw arts zal u misschien adviseren om deze niet tegelijkertijd met ENTEROSGEL® te gebruiken.

ENTEROSGEL® is niet geïndiceerd voor gebruik bij acute chemische vergiftiging of vergiftiging door medicijnen of overdosis van medicijnen.

Gebruik ENTEROSGEL® niet na de op de verpakking vermelde vervaldatum.

ENTEROSGEL® kan ook worden ingenomen gedurende de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding. Het is raadzaam om uw arts te raadplegen als u zich onwel voelt tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding. Raadplaag uw arts voordat u ENTEROSGEL® begint te gebruiken.

3. HOE WORDT ENTEROSGEL® GEBRUIKT

- Gebruik een dosis van ENTEROSGEL® na de eerste dunne stoelgang.
- Gebruik ENTEROSGEL® minimaal 2 uur voor of na het gebruik van een oraal geneesmiddel.
- Gebruik ENTEROSGEL® minimaal 1-2 uur voor of na het eten.
- Verduin de dosis voor toediening met water op kamertemperatuur.
- Gebruik het sachet direct na opening.
- Tube voor gebruik goed schudden.
- Na opening van de tube deze binnen 30 dagen gebruiken.



De behandelingsduur met ENTEROSGEL® bedraagt:

- 3-5 dagen bij acute diarree,
- Tot 30 dagen bij het prikkelbare darm syndroom met diarree. De pauze bij herhaald gebruik moet minimaal 3 dagen zijn.
- Voor kinderen tot 3 jaar wordt aanbevolen eerst een arts te raadplegen.
- Op dag 1 van de behandeling, kunt u de eerste dosis verdubbelen en vervolgens doorgaan met een enkele dosis na elke ontlasting. Op de eerste dag maximaal acht dosissen.
- Tijdens de behandeling van chronische diarree kunt u de dosering aanpassen aan de consistente en frequentie van de ontlasting. U mag 3x per dag een dubbele dosis gebruiken indien de ontlasting dun is. Als de ontlasting weer normaal is de dosis verlagen tot 1x daags. Maximaal mogen 6 dosissen per dag worden ingenomen.
- Onderbrek de behandeling met ENTEROSGEL® als u gedurende 1-2 dagen geen ontlasting heeft, en verhoog de waterinname. Ga pas door met ENTEROSGEL® nadat de volgende ontlasting is geweest.

4. MOGELIJKE ONGEWENSTE BIJWERKINGEN

Constipatie, misselijkheid (nausea)

5. HOE WORDT ENTEROSGEL® BEWAARD

- ENTEROSGEL® mag niet worden gebruikt na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Bewaar ENTEROSGEL® tussen 4°C en 30°C.
- Voorkom bevrissing.
- Niet blootstellen aan extreme hitte of direct zonlicht.
- De houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat, heeft betrekking op een correct opgeslagen ongeopend product.

Sachets

- Eenmaal geopend, kan elk sachet slechts één keer worden gebruikt.
- De sachets mogen slechts één keer worden gebruikt. Open ze onmiddellijk voor gebruik.
- Gebruik gedeeltelijk gebruikte zakjes niet opnieuw om microbiële verontreiniging te voorkomen.

Tube

- Sluit na het openen en bij elk gebruik de dop van de tube stevig om microbiële verontreiniging te voorkomen.

Bij knippen in de tube van ENTEROSGEL® kan een geringe hoeveelheid vloeistof (water) vrijkommen.

6. INHOUD VAN HET PAKKET EN ANDERE INFORMATIE

Samenstelling: Polymethylsiloxaan polyhydraat methyl siccumzuur hydrogel, ~70 %, gezuerd water – 30%.

Verpakkingsgroottes

- ENTEROSGEL® orale suspensie
- Tube 225 g
 - Tube 90 g
 - Sachet 15 g (10 sachets per verpakking)

VERWIJDERING

Er zijn geen speciale maatregelen voor het verwijderen van het ongebruikte preparaat ENTEROSGEL®. Het product kan veilig worden weggegooid bij het huishoudelijke afval. De verpakking kan worden gerecycled.

Houdbaarheid: tot de datum vermeld op de verpakking

Leeftijd	Dosering	Hoe vaak
Tot 1 jaar	2,5 g (~1/2 theelepel) oplossen in 7,5-15 ml water.	3x per dag
1-6 jaar	5 g (~1 theelepel) oplossen in 50-100 ml water.	3x per dag
7-14 jaar	10 g (~2 theelepel) oplossen in 50-100 ml water.	3x per dag
15+ en volwas- senen	15 g tot 22,5 g (~1 eetlepel of 1-1,5 sachet), verdunnen in 200 ml water.	3x per dag

Als u nog vragen heeft over het gebruik van het prepa- rat ENTEROSGEL®, kunt u een e-mail sturen naar: info@enterosgel.eu.

Deze bijsluiter is ook beschikbaar in andere talen op www.enterosgel.eu.

FABRIKANT:

Bioline Products s.r.o.
Krakovská 1338/10,
110 00 Praag, Tsjechische Republiek
www.enterosgel.eu



DISTRIBUTIE:

Promuco, Hoofdstraat 24
4265HK Genderen, info@enterosgel.nl

DATUM VAN DE BIJGEWERKTE VERSIE VAN DE BIJSLUITER:

08.08.2022

VERSIE: TUV/IFU/NL/NB/2

UITLEG VAN GRAFISCHE SYMBOLEN OP DE VERPAKKING:

	Gebruik niet herhaaldelijk
	Gecertificeerd medisch hulpmiddel
	Minimale houdbaarheid
	Eenmalige verpakking
	Deponeer de gebruikte verpakking in de juiste afvalcontainer. De verpakking kan hergebruikt worden
	Batch
	Fabrikant
	Buiten het bereik van direct zonlicht bewaren
	Lees de gebruiksaanwijzing
	Temperatuurbereik



Entgiftungsmittel

Gastrointestinales Adsorbens zur Behandlung von akuten Durchfällen und Reizdarm-Syndrom mit Durchfall

INHALT DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG

- Was ist ENTEROSGEL® und wozu wird es benutzt
- Was Sie wissen müssen, bevor Sie ENTEROSGEL® einnehmen
- Wie wird ENTEROSGEL® angewendet
- Mögliche unerwünschte Nebenwirkungen
- Aufbewahrung von ENTEROSGEL®
- Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST ENTEROSGEL® UND WOZU WIRD ES BENUTZT

ENTEROSGEL® ist eine perorale Suspension, indiziert bei:

- symptomatischer Behandlung von akuten Durchfall-Erkrankungen,**
- Reizdarm-Syndrom mit Durchfall (IBS-D).**

ENTEROSGEL® ist ein perorales Darm-Adsorbens (Enterosorbens) auf Basis von organischen Mineralen, adsorptionsfähig gegenüber einigen Gift- und Schadstoffen im Darm (z.B. Endotoxine), die es physikalisch an seiner Oberfläche bindet und somit die Häufigkeit der Darmentleerungen und damit auch die Dauer des Durchfalls reduziert.

ENTEROSGEL® wird mit dem Stuhlgang ausgeschieden und beseitigt somit die adsorbierten Toxine und Schadstoffe, was eine wohltuende Auswirkung bei der Behandlung von indizierten Zuständen haben kann.

ENTEROSGEL® lindert Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen en Entleerungszwang bei Patienten mit RDS-D.

ENTEROSGEL® enthält keine Konservierungsstoffe, Gluten, Zucker, Süßstoffe, Laktose, Fette, Geschmacksverstärker, Farbstoffe oder Zutaten pflanzlichen oder tierischen Ursprungs.

2. WAS SIE WISSEN MÜSSEN, BEVOR SIE ENTEROSGEL® EINNEHMEN

Benutzen Sie kein ENTEROSGEL® (Kontraindikation):

- wenn Sie gleichzeitig perorale Arzneimittel mit modifizierter (gesteuerte) Freisetzung einnehmen.
- wenn Sie an Darmatonie oder Darmverschluss (ernsthafte Verstopfung infolge Darmobstruktion) leiden.
- Im Falle der Unverträglichkeit des Präparates in der Vergangenheit.

Hinweisung und Maßnahmen

- Benutzen Sie ENTEROSGEL® mindestens zwei Stunden vor oder nach der Einnahme eines peroralen Arzneimittels. ENTEROSGEL® kann die Absorption mancher Medikamente beeinflussen, die peroral eingenommen werden. Wenn Sie Arzneimittel verwenden, können Sie hinsichtlich der Einnahme von ENTEROSGEL® auch Ihren Arzt oder Apotheker zu Rate ziehen.
- Im Falle von lang anhaltendem Durchfall ist es notwendig sich vor der Anwendung von ENTEROSGEL® mit Ihrem Arzt zu beraten, zwecks Bestimmung einer Diagnose der zugrunde liegenden Krankheit.
- Bei Kindern sollte die Behandlung von Durchfall durch ausreichende Flüssigkeitszufuhr oder orale Rehydrationslösung ergänzt werden, um eine Dehydratierung zu verhindern.
- Bei Erwachsenen wird während der Behandlung mit ENTEROSGEL® eine Flüssigkeitszufuhr oder eine orale Rehydrationslösung empfohlen, um eine angemessene Rehydratation sicherzustellen.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Behandlungsdauer und nehmen Sie ENTEROSGEL® nicht zusammen mit Nahrungsmittelein, um eine mögliche Adsorption von Vitaminen oder Nährstoffen zu vermeiden.
- Hält der Durchfall länger als zwei Tage an, ist es notwendig, einen Arzt aufzusuchen.
- Bei Fieber, Blut in Stuhl, Anzeichen von Dehydratierung, sechs oder mehr Stuhlgänge in den letzten 24 Stunden, Durchfall und Erbrechen gleichzeitig, starke oder ständige Bauchschmerzen, suchen Sie so schnell wie möglich einen Arzt auf, besonders wenn Kinder betroffen sind.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosis und die empfohlene Behandlungsdauer.
- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie derzeit andere Darmadsorbenten einnehmen, wie z. B. Produkte, die Aktivkohle, Lehm oder Kaolin enthalten. Ihr Arzt wird Ihnen vielleicht raten, diese nicht gleichzeitig mit ENTEROSGEL® einzunehmen.
- ENTEROSGEL® ist nicht für die Anwendung bei akuten chemischen Vergiftungen oder Medikamentenüberdosierungen indiziert.
- Nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

ENTEROSGEL® kann auch während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Arzt aufsuchen, wenn Sie sich während der Schwangerschaft oder Stillzeit nicht wohl fühlen. Bitte beraten Sie sich vor der Einnahme von ENTEROSGEL® mit Ihrem Arzt.

3. WIE WIRD ENTEROSGEL® ANGEWENDET

- Nehmen Sie die entsprechende Dosis von ENTEROSGEL® nach dem ersten dünnen Stuhlgang ein.
- Benutzen Sie ENTEROSGEL® mindestens 2 Stunden vor oder nach der Einnahme eines peroralen Medikamentes.
- Nehmen Sie ENTEROSGEL® mindestens 1-2 Stunden vor oder nach dem Essen ein.
- Vor der Anwendung verdünnen Sie die Dosis mit Wasser in Zimmertemperatur.
- Benutzen Sie den Beutel sofort nach dem Öffnen.
- Die Tube vor dem Öffnen und jedem Gebrauch gut schütteln.
- Die Tube bis zu 30 Tagen nach dem Öffnen verbrauchen.

Alter	Dosierung	Wie oft
Unter 1 Jahr	2,5 g (~1/2 Teelöffel) verdünnen in 7,5-15 ml Wasser.	3x täglich
1-6 Jahre	5 g (~1 Teelöffel) verdünnen in 50-100 ml Wasser.	3x täglich
7-14 Jahre	10 g (~2 Teelöffel) verdünnen in 50-100 ml Wasser.	3x täglich
15+ und Erwachsene	15 g bis 22,5 g (~1 Suppen-löffel oder 1-1,5 Beutel) verdünnen in 200 ml Wasser.	3x täglich



Behandlungsdauer mit ENTEROSGEL®:

- 3-5 Tage bei akutem Durchfall.
- Bis zu 30 Tagen bei Reizdarm-Syndrom mit Durchfall. Die Pause zwischen wiederholter Anwendung sollte mindestens 3 Tage betragen.
- Bei Kindern unter 3 Jahren wird empfohlen, vor der Einnahme den Arzt zu fragen.
- Am Anfang der Behandlung (Tag 1) kann die erste Dosis verdoppelt werden und dann mit einzelner Dosis nach jedem Stuhlgang fortgesetzt werden. Am ersten Tag maximal acht Dosen.
- Bei Behandlung von chronischem Durchfall kann die Dosierung an Konsistenz und Häufigkeit des Stuhlgangs angepasst werden. Bei dünnem Stuhlgang kann eine doppelte Dosis bis zu 3x täglich eingenommen werden, bei normalem Stuhlgang dann auf eine Dosis 1x täglich senken. Höchstens können sechs Dosen am Tag eingenommen werden.
- Die Behandlung mit ENTEROSGEL® ist zu unterbrechen, wenn Sie 1-2 Tage keinen Stuhlgang haben, dann erhöhen Sie die Wasserzufuhr und setzen die Behandlung nach dem nächsten Stuhlgang fort.

ENTSORGUNG

Auf die Liquidierung des unverbrauchten ENTEROSGEL® beziehen sich keine besonderen Maßnahmen. Das Präparat kann bedenkenlos mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Die Verpackung kann wiederverwertet werden.

Haltbarkeit: bis zum Verfallsdatum auf der Verpackung

Haben Sie weitere Fragen bezüglich der Anwendung von ENTEROSGEL®, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@enterosgel.eu.

Diese Packungsbeilage gibt es auf www.enterosgel.eu auch in anderen Sprachen.



HERSTELLER:
Bioline Products s.r.o.
Královská 1338/10,
110 00 Prag, Tschechische Republik
www.enterosgel.eu

DISTRIBUTOR:
Promuco, Hoofstraat 24
4265HK Genderen, info@enterosgel.nl

DATUM DER AKTUALISIERTEN VERSION DER PAKUNGS-BEILAGE: 08.08.2022

VERSION: TUV/IFU/NL/NB/2

ERKLÄRUNG DER GRAPHISCHEN SYMbole AUF DER VERPACKUNG:



Nicht zur Wiederverwendung



Zertifiziertes Medizinprodukt



Verwendbar bis



Einweg-Verpackung



Chargenbezeichnung



Die benutzte Verpackung ist in den entsprechenden Müllbehälter zu entsorgen. Die Verpackung ist wiederverwertbar



Hersteller




Für diese Verpackung wurde eine Gebühr an die autorisierte Verpackungsgesellschaft entrichtet.



Gebrauchsanweisung beachten



Vor Sonnenlicht schützen.



Temperaturbegrenzung



30°C

4°C

CE 0123
Medizinprodukt Klasse IIa



EN
Gastrointestinal adsorbent for use in Acute Diarrhoea and Irritable bowel syndrome with diarrhoea

WHAT IS IN THIS LEAFLET

- 1.What is ENTEROSGEL® and what it is used for
- 2.What you need to know before you take ENTEROSGEL®
- 3.How to take ENTEROSGEL®
- 4.Possible side effects
- 5.How to store ENTEROSGEL®
- 6.Content of the pack and other information

1. WHAT IS ENTEROSGEL® AND WHAT IT IS USED FOR

ENTEROSGEL® is an oral suspension indicated for the:

- Symptomatic treatment of acute diarrhoea
- Treatment of Irritable bowel syndrome with diarrhoea (IBS-D).

ENTEROSGEL® is an oral intestinal adsorbent (enterosorbent) based on organic mineral with adsorption capacity towards some toxic and harmful substances in the gut (e.g., endotoxins, enterotoxins), physically binding them to its surface, reducing stool frequency and duration of diarrhoea.

ENTEROSGEL® is expelled from the body with the stool, this way eliminating the adsorbed toxins and harmful substances, which can be beneficial for treatment of indicated conditions.

ENTEROSGEL® relieves symptoms of diarrhoea, abdominal pain, bloating and urgency in IBS-D patients.

ENTEROSGEL® is free from preservatives, gluten, sugar, sweeteners, lactose, fat, flavours, colouring, plant or animal-derived ingredients.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE ENTEROSGEL®

DO NOT USE ENTEROSGEL® if (contraindications):

- you are currently taking modified-release orally administered medications.
- you have intestinal atony or intestinal blockage (severe constipation due to bowel obstruction).
- you have intolerance based on prior use of ENTEROSGEL®.

Precautions

- Do not use ENTEROSGEL® within 2 hours before or after taking oral medication. ENTEROSGEL® may affect the absorption of some medicines that are administered orally. If you are taking any medication, you may wish to consult with your doctor or pharmacist regarding taking ENTEROSGEL®.
- In case of long-term diarrhoea you should consult a doctor to obtain a diagnosis of the underlying condition before taking ENTEROSGEL®.
- In children, treatment of diarrhoea should be accompanied by plenty of fluids which may include an oral rehydration solution (ORS) to avoid dehydration.
- In adults, it is advisable to consume water or an ORS during the treatment with ENTEROSGEL® to assure proper hydration.

• Do not exceed the recommended duration of treatment and do not take together with meals to avoid possible adsorption of vitamins or nutrients.

• If diarrhoeal symptoms persist for more than 2 days you should consult your doctor.

• If there is fever, blood in your stools, signs of dehydration, six or more episodes of diarrhoea in the last 24 hours, diarrhoea and vomiting at the same time, or a severe or continuous stomach ache, seek medical advice especially in the case of children as soon as possible.

• Do not exceed the recommended dose and do not exceed the recommended duration of treatment.

• Please, consult your doctor if you are currently taking other intestinal adsorbents, for example treatments which contain activated charcoal, clay, kaolin. Your doctor may advise not to use them together with ENTEROSGEL® treatment.

• ENTEROSGEL® is not indicated for use in case of acute chemical or drug poisoning or medicinal overdose.

• Do not use beyond the expiry date indicated on the package.

ENTEROSGEL® can be used during pregnancy and breastfeeding.

It is advisable to consult with your healthcare professional if you are unwell during pregnancy or breastfeeding. Please, consult your doctor before taking ENTEROSGEL®.

3. HOW TO TAKE ENTEROSGEL®

- Take the necessary dose of ENTEROSGEL® after the first loose stool.
- Take ENTEROSGEL® at least 2 hours before or after taking oral medications.
- Take ENTEROSGEL® at least 1-2 hours before or after a meal.
- Dilute the dose in the water of room temperature before its administration.
- Use sachet immediately after opening.
- Shake the tube well before opening and each use.
- Use a tube within 30 days after opening.



Duration of the treatment with ENTEROSGEL® is:

- 3-5 days for acute diarrhoea
- Up to 30 days for IBS-D. Break between repeated use should be at least 3 days.
- Prior the use in children under 3 years old is advisable to consult a doctor.
- In the beginning of the treatment (on day 1) you can double the first dose and then continue with a single dose after each bowel movement. Maximum 8 doses on the first day.
- During treatment of chronic diarrhoea, you may adjust your dosage to suit your stool consistency and bowel movements. You can increase treatment to double dose up to 3 times a day if your stool is loose, or reduce to a single dose once a day if your stool is normal. Maximum 6 doses per day.
- Stop the treatment with ENTEROSGEL® if you do not have bowel movement for 1-2 days, increase intake of water and continue the treatment after the next bowel movement.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Constipation, nausea

5. HOW TO STORE ENTEROSGEL®

- ENTEROSGEL® should not be used after the expiry date on the package.
- Keep out of reach of children.
- Store ENTEROSGEL® at temperature between 4 °C and 30 °C.
- Do not freeze.
- Keep away from direct sunlight and heat.
- The expiration date on the package refers to when the product is unopened and when properly stored.

MANUFACTURER:

Bioline Products s.r.o.
Královská 1338/10,
110 00 Prague, Czech Republic
www.enterosgel.eu

Bioline Products

DISTRIBUTOR :
Promuco, Hoofstraat 24
4265HK Genderen, info@enterosgel.nl

LEAFLET DATE OF UPDATED ISSUE: 08.08.2022
VERSION: TUV/IFU/NL/NB/2

EXPLANATION OF GRAPHIC SYMBOLS ON PACKAGE:



Do not re-use



Certified medical device



Minimum shelf life



Disposable packaging



Batch code



Dispose of used packaging in appropriate waste receptacle. Packaging can be recycled



Manufacturer



A fee for the national packaging management system has been paid for this packaging.



Please read the instructions



Keep away from direct sunlight



Temperature range

Age	Dosage	How Often
Under 1 year	2,5g (\approx 1/2 teaspoon) diluted in 7,5–15ml of water.	3 times a day
1-6 years old	5g (\approx 1 teaspoon) diluted in 50–100ml of water.	3 times a day
7-14 years old	10g (\approx 2 teaspoons) diluted in 50–100ml of water.	3 times a day
15+ and adults	15g to 22,5g (\approx 1 tablespoon or 1–1,5 sachet) diluted in 200ml of water.	3 times a day

When squeezing ENTEROSGEL® out of the tube or a sachet some amount of liquid may appear.

6. CONTENT OF THE PACK AND OTHER INFORMATION

Composition: Polymethylsiloxane polyhydrate (methylsilicic acid hydrogel) – 70%, purified water – 30%.

Package size

ENTEROSGEL® oral suspension

- Tube 225 g
- Tube 90 g
- Sachet 15 g (10 sachets per pack)

DISPOSAL

There are no special disposal requirements for unused ENTEROSGEL®. It can be safely disposed into the domestic waste. Packaging can be recycled.

Shelf life: Until dated indicated on package

If you have any further questions about use of ENTEROSGEL® please email: info@enterosgel.eu.

This instructions for use leaflet (IFU) is also available in other languages at www.enterosgel.eu.

CE 0123
Medical Device class IIa



ENTEROSGEL®

Детоксикиращ препарат



Стомашно-чревен адсорбент за приложение при остра диария и синдром на раздразненото черво с диария

КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА

1. Какво представлява ENTEROSGEL® и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ENTEROSGEL®
3. Как да приемате ENTEROSGEL®
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ENTEROSGEL®
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ENTEROSGEL® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ENTEROSGEL® е перорална суспензия, която се прилага при:

- симптоматично лечение на остра диария,
- синдром на раздразненото черво с диария (IBS-D).

ENTEROSGEL® орален чревен адсорбент (ентеросорбент), който се основава на органичен минерал с адсорбционна способност към някои токсични и вредни вещества в червата (напр. ендотоксини, ентеротоксини), като ги свързва физически с повърхността си и по този начин може да намали честотата на изпражненията и продължителността на диарията.

ENTEROSGEL® се изхвърля от тялото с изпражненията, като по този начин отстранява адсорбираните токсини и вредни вещества, което може да има благоприятен ефект при лечението на установените състояния.

ENTEROSGEL® облекчава диарията, коремната болка, подуването на корема и настойчивата нужда от дефекация при пациенти с IBS-D.

ENTEROSGEL® не съдържа консерванти, глутен, захар, подсладители, лактоза, мазнини, ароматизатори, съставки от растителен или животински произход.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ENTEROSGEL®

Не използвайте ENTEROSGEL® (противопоказания):

- Ако приемате едновременно перорални лекарства с модифицирано (кон-тролирано) освобождаване.
- Ако страдате от чревна атония или чревна непроходимост (тежък запек поради чревна непроходимост).
- В случай на непоносимост към продукта при предишна употреба.

Предупреждения и предпазни мерки

- Не вземайте ENTEROSGEL® по-малко от два часа преди или след прием на перорални лекарства. ENTEROSGEL® може да повлияе на усвояването на някои лекарства, които се прилагат перорално. Ако вземате други лекарства, може да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт относно употребата на ENTEROSGEL®.
- В случай на продължителна диария трябва да се направи консултация с лекар преди приема на ENTEROSGEL® за да се диагностицира основното заболяване.

• При децата лечението на диарията трябва да се допълва с прием на достатъчно количество течности или перорален разтвор за рехидратация, за да се предотврати обезводняването.

• При възрастни се препоръчва прием на течности или перорален разтвор за рехидратация по време на лечението с ENTEROSGEL®, за да се осигури правилна рехидратация.

• Не превишавайте препоръканата продължителност на лечение и не приемайте заедно с храна, за да избегнете възможен недостиг на витамини или хранителни вещества.

• Ако диарията продължава повече от два дни, необходимо е да се консултирате с лекар.

• В случай на повищена температура, кръв в изпражненията, признаки на де-хидратация, шест или повече изхожданя през последните 24 часа, диария и повършане едновременно, сила или постоянна болка в корема, потърсете лекарска помощ възможно най-скоро, особено ако става въпрос за деца.

• Не превишавайте препоръканата доза и не превишавайте препоръканата продължителност на лечението.

• Моля, посъветвайте се с Вашия лекар, ако в момента приемате други чревни адсорбенти, като например продукти, които съдържат активен въглен, глина или каолин. Вашият лекар може да Ви посъветва да не ги приемате едновременно с ENTEROSGEL®.

• ENTEROSGEL® не е предназначен за употреба в случаи на остро отравяне с химикали или предозиране на лекарства.

• Не използвайте след изтичане на срока на годност, посочен на опаковката.

ENTEROSGEL® може да се употребява по време на бременност и кърмене.

Препоръчително е да се консултирате с Вашия лекар, ако не се чувствате добре във време на бременност или кърмене. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, преди да започнете да приемате ENTEROSGEL®.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ENTEROSGEL®

• Вземете необходимата доза ENTEROSGEL® след първото разлабено изпражнение.

• Вземайте ENTEROSGEL® поне 2 часа преди или след прием на перорални лекарства.

• Вземайте ENTEROSGEL® поне 1-2 часа преди или след хранение.

• Преди прием разредете дозата във вода със стайна температура.

• Използвайте сашето веднага след отваряне.

• Разплъзгайте добре тубата преди отваряне и преди всяка употреба.

• Използвайте тубата до 30 дни след отварянето ѝ.



Възраст	Дозировка	Колко често
до 1 година	2,5 g (≈1/2 чаена лъжиичка) разредете в 7,5-15 ml вода.	3 пъти на ден
от 1 до 6 години	5 g (≈ 1 чаена лъжиичка) разредете в 50-100 ml вода.	3 пъти на ден
от 7 до 14 години	10 g (≈ 2 чаени лъжиички) разредете в 50-100 ml вода.	3 пъти на ден
над 15 години и възрастни	15 g до 22,5 g (≈ 1 супена лъжиичка или 1-1,5 сашета) разредете в 200 ml вода.	3 пъти на ден



Детоксикаращ препарат

Продължителността на лечението с ENTEROSGEL® е:

- От 3 до 5 дни при остра диария,
- До 30 дни при синдром на раздразненото черво с диария. Прекъсването между повторната употреба трябва да бъде най-малко 3 дни.
- Препоръчително е да се консултирате с лекар преди употреба при деца под тригодишна възраст.
- В началото на лечението (1-ви ден) можете да удвоите първата доза и след това да продължите с единична доза след всяко изпражнение. Не повече от осем дози в първия ден.
- По време на лечението на хронична диария можете да коригирате дозата, така че да съответства на консистенцията и честотата на изпражненията. Възможно е да приемате двойна доза до 3 пъти дневно, ако изпражненията са разредени, или да намалите до единична доза веднъж дневно, ако изпражненията са нормални. Могат да се приемат най-много шест дози на ден.
- Преустановете лечението с ENTEROSGEL® ако в продължение на 1-2 дни нямate изходждания, увеличите приема на вода и възстановете лечението след следващото изходждане.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Запек, гадене (наузея)

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ENTEROSGEL®

- ENTEROSGEL® не трябва да се използва след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
- Съхранявайте ENTEROSGEL® при температура от 4 °C до 30 °C.
- Пазете от замръзване.
- Не излагайте на прекомерна топлина или пряка слънчева светлина.
- Срокът на годност, посочен върху опаковката, се отнася за правилно съхраняван неотворен продукт.

Сашета

- След отваряне всяко саше може да се използва само веднъж.
- Всяко саше е за еднократна употреба и трябва да се отвори непосредствено преди употреба.
- Не използвайте повторно частично използвани сашета, за да предотвратите микробно замърсяване.

Туби

- След отваряне и след всяка употреба затваряйте пълно капачката на тубата, за да предотвратите изсъхване и микробно замърсяване.

При изстискване на ENTEROSGEL® от тубата или сашето може да се появи малко количество течност.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Състав: полиметилсилоксан полихидрат (метилсилициев киселинен хидрогел) – 70 %, пречистена вода – 30 %.

Съдържание на опаковката

- ENTEROSGEL® перорална суспензия
- Туба 225 g
- Туба 90 g
- Саше 15 g (10 сашета в една опаковка)

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Няма специални изисквания за изхвърляне на неизползван ENTEROSGEL®. Може безопасно да се изхвърли в домакинските отпадъци. Опаковката може да се рециклира.

Срок на годност: до датата посочена върху опаковката

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на ENTEROSGEL®, моля пишете на имейл: info@enterosgel.eu.

Тази листовка е достъпна и на други езици на адрес www.enterosgel.eu.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:



Bioline Products s.r.o.
Královská 1338/10,
110 00 Prague, Czech Republic
www.enterosgel.eu

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНОТО ИЗДАНИЕ НА ЛИСТОВКАТА:

08.08.2022

ИЗДАНИЕ:

TUV/IFU/BG/NB/2

ОБЯСНЕНИЯ НА ГРАФИЧНИТЕ СИМВОЛИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА:

Не използвайте повторно

Опаковка за еднократна употреба

Минимален срок на годност

Изхвърлете използваната опаковка в подходящ контейнер за отпадъци. Опаковката може да се рециклира

LOT

Партида

Производител

За тази опаковка е платена такса на оторизирана компания за опаковане.

Моля, прочетете инструкциите

Температурен диапазон
4°C – 30°C

Да се пази от пряка слънчева светлина

Сертифициран медицински продукт

CE 0123

Медицинско изделие клас IIa



ENTEROSGEL®

za detoksifikaciju organizma



Gastrointestinalni adsorbent za primjenu kod akutnog proljeva i sindroma iritabilnog crijeva s proljevom

ŠTO SE NALAZI U OVOJ UPUTI:

- 1. Što je ENTEROSGEL® i za što se koristi
- 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati ENTEROSGEL®
- 3. Kako uzimati ENTEROSGEL®
- 4. Mogući štetni događaji
- 5. Kako čuvati ENTEROSGEL®
- 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. ŠTO JE ENTEROSGEL® I ZA ŠTO SE KORISTI

ENTEROSGEL® je oralna suspenzija indicirana za:

- Simptomatsko liječenje akutnog proljeva.
- Liječenje sindroma iritabilnog crijeva s proljevom (eng. IBS-D).

ENTEROSGEL® je oralni crijevni adsorbent (enterosorbent) na bazi organskog minerala koji ima sposobnost adsorpcije nekih toksičnih i štetnih tvari u crijevima (npr. endotoksina, enterotoksina) koje fizički veže na svoju površinu, smanjujući učestalost stolice i trajanje proljeva.

ENTEROSGEL® se uklanja iz tijela stolicom, na taj način se uklanjuju adsorbirani toksini i štetne tvari što može biti korisno za liječenje indiciranih stanja.

ENTEROSGEL® ublažava simptome proljeva, bolova u trbuhi, nadutosti i potrebu za pražnjenjem kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva s proljevom (eng. IBS-D).

ENTEROSGEL® ne sadrži konzervante, gluten, šećer, zasladičave, laktuzu, masti, arome, bojila, sastojke biljnog ili životinjskog podrijetla.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ENTEROSGEL®

Nemojte uzimati ENTEROSGEL® (kontraindikacije):

- Ako istodobno uzimate lijekove s prilagođenim oslobadanjem koji se uzmaju kroz usta.
- Ako imate atoniju crijeva ili neprohodnost crijeva (teški zatvor zbog opstrukcije crijeva).
- Ako je poznato nepodnošenje temeljem prethodnog uzimanja ENTEROSGEL-a.

Upozorenja

- Nemojte uzimati ENTEROSGEL® 2 sata prije ili poslije uzimanja lijekova koji se uzimaju kroz usta. ENTEROSGEL® može utjecati na apsorpciju nekih lijekova koji se uzimaju kroz usta. Ako uzimalo bilo koje lijekove, savjetujte se svojim liječnikom ili ljekarnicom o uzimanju ENTEROSGEL-a.
- U slučaju dugotrajnog proljeva, trebate se posavjetovati s liječnikom prije uzimanja ENTEROSGEL-a kako bi se utvrdila dijagnoza osnovne bolesti.
- U djece, liječenje proljeva treba biti praćeno povećanim unosom tekućine, te može uključivati oralnu rehidracijsku otopinu (eng. ORS) za sprječavanje dehidracije.

• U odraslih, tijekom liječenja ENTEROSGEL-om, preporuča se unos vode ili oralne rehidracijske otopine (eng. ORS) kako bi se osigurala pravilna hidracija.

- Nemojte uzimati dulje od preporučenog trajanja liječenja i ne uzimajte za jednu godinu uz obrok kako biste izbjegli moguću adsorpciju vitamina i hranjivih tvari.
- Ako simptomi proljeva traju dulje od 2 dana, treba se obratiti liječniku.
- Ako imate vrućicu, krv u stolici, znakove dehidracije, šest ili više proljeva u posljednja 24 sata, istovremeno proljev i povraćanje, ili jaku ili stalnu bol u trbuhi, potražite savjet liječnika što je prije moguće, osobito ako se radi o djeci.
- Nemojte uzeti više od preporučene doze i nemojte uzimati dulje od preporučenog trajanja liječenja.
- Molimo, obratite se svom liječniku ako trenutno uzimate druge crijevne adsorbente, na primjer aktivni ugljen, glinu ili kaolin. Liječnik će Vam možda savjetovati da ih ne uzimate istodobno uz liječenje ENTEROSGEL-om.
- ENTEROSGEL® nije indiciran za primjenu u slučaju akutnog trovanja kemijskim ili lijekovima ili predoziranja lijekovima.
- Nemojte uzimati nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

ENTEROSGEL® se može uzimati tijekom trudnoće i dojenja. Ako se tijekom trudnoće ili dojenja ne osjećate dobro, savjet je obratiti se zdravstvenom radniku. Prije uzimanja ENTEROSGEL-a, obratite se svom liječniku.

3. KAKO UZIMATI ENTEROSGEL®

- Nakon prve rijetke stolice uzmite potrebnu dozu ENTEROSGEL-a.
- ENTEROSGEL® uzmite najmanje 2 sata prije ili poslije uzimanja lijekova koji se uzimaju kroz usta.
- ENTEROSGEL® uzmite najmanje 1-2 sata prije ili poslije obroka.
- Prije primjene, razrijedite dozu u vodi sobne temperature.
- Sadržaj vrećice uzmite odmah nakon otvaranja.
- Prije otvaranja i svake primjene, tubu dobro protresite.
- Nakon otvaranja tube, iskoristite u roku od 30 dana.



Dob	Doziranje	Koliko često
Do 1 godine	2,5 g (\approx ½ čajne žličice) razrijediti u 7,5 do 15 ml vode	3 puta na dan
1 do 6 godina	5 g (\approx 1 čajna žličica) razrijediti u 50 do 100 ml vode	3 puta na dan
7 do 14 godina	10 g (\approx 2 čajne žličice) razrijediti u 50 do 100 ml vode	3 puta na dan
15+ i odrasli	15 do 22,5 g (\approx 1 jušna žlica ili 1 do 1,5 vrećica) razrijediti u 200 ml vode	3 puta na dan



ENTEROSGEL®

Za detoksifikaciju organizma

Trajanje liječenja ENTEROSGEL-om:

- 3 do 5 dana kod akutnog proljeva.
- Do 30 dana u slučaju sindroma iritabilnog crijeva s prolejem. Pauza između ponovljene primjene trebala bi biti najmanje 3 dana.
- Prije primjene u djecu mlađe od 3 godine, preporuka je obratiti se lječniku.
- Na početku liječenja (prvi dan) može se udvostručiti prva doza i zatim nastaviti s jednom dozom nakon svake stolice. Prvi dan najviše 8 doza.
- Tijekom liječenja kroničnog proljeva može se prilagoditi doziranje kako bi odgovaralo konzistenciji i učestalosti stolice. Može se uzeti dvostruku dozu do 3 puta na dan ako je stolica rijetka, ili smanjiti doziranje na jednu dozu 1 put na dan, ako je stolica normalna. Najviše se može uzeti 6 doza na dan.
- Ako tijekom 1 do 2 dana nemate stolicu, prekinite liječenje ENTEROSGEL-om, povećajte unos vode te nastavite liječenje nakon slijedeće stolice.

4. MOGUĆI ŠTETNI DOGAĐAJI

Zatvor, mučnina.

5. KAKO ČUVATI ENTEROSGEL®

- ENTEROSGEL® se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- ENTEROSGEL® čuvati na temperaturi od 4 °C do 30 °C.
- Ne zamrzavati.
- Čuvati zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti i topline.
- Rok valjanosti naveden na pakiranju odnosi se na neotvoren i pravilno čuvan proizvod.

Za vrećice

- Nakon otvaranja, jednu vrećicu treba koristiti samo jednom.
- Jedna vrećica je za jednokratnu primjenu i treba se otvoriti neposredno prije primjene.
- Nemojte primijeniti već djelomično korištenu vrećicu kako bi se sprječilo onečišćenje mikrobima.

Za tube

- Nakon otvaranja i svake primjene čvrsto zatvorite zatvarač na tubi u svrhu sprječavanja isušivanja i onečišćenja mikrobima.

Pri istiskivanju ENTEROSGEL-a iz tube ili vrećice može se pojavit malo količina tekućine.

6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Sastav: polimetilsiloskan polihidrat (hidrogel metil silikatne kiseline) – 70 %, pročišćena voda – 30 %.

Veličine pakiranja:

ENTEROSGEL® oralna suspenzija

- tuba 225 g
- tuba 90 g
- vrećice 15 g (10 vrećica u pakiranju)

ZBRINJAVANJE

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje neiskorištenog ENTEROSGEL-a. Može se sigurno baciti u kućni otpad. Pakiranje se može reciklirati.

Rok valjanosti: do datuma navedenog na pakiranju.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ENTEROSGEL-a, molimo pošaljite mail na: info@enterosgel.eu

Ova uputa za uporabu je također dostupna na drugim jezicima na: www.enterosgel.eu

PROIZVOĐAČ:



Bioline Products s.r.o.
Krakovská 1338/10
110 00 Prag, Republika Česka
www.enterosgel.eu

DISTRIBUTER ZA REPUBLIKU HRVATSNU:

Oktal Pharma d.o.o.
Utinjska 40, 10020 Zagreb

NOSILAC ODOBRENJA U BOSNI I HERCEGOVINI:

Oktal Pharma d.o.o.
Pijačna 14 A, Sarajevo
Broj potvrde: 06-07.4.1-9315-1/21
od 03.11.2021.

OVA UPUTA JE POSLJEDNJI PUT REVIDIRANA: 08.08.2022.

VERZIJA: TUV/IFU/HR/NB/2

OBJAŠNJENJE GRAFIČKIH ZNAKOVA NA PAKIRANJU:



Nemojte ponovno koristiti



Minimalni rok valjanosti



Broj serije



Proizvođač



Molimo pročitati uputu za uporabu



Temperaturni raspon



Certificiran medicinski proizvod



Nepovratno pakiranje



Iskorišteno pakiranje baciti u odgovarajući otpad. Pakiranje se može reciklirati.



Za ovo pakiranje je uplaćena pristojba u nacionalni sustav za zbrinjavanje otpada.



Čuvati zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti.

CE 0123

Medičinski proizvod klase rizika IIa



ENTEROSGEL®

Méregtelenítő készítmény



Gyomor-bélrendszeri adszorbens akut hasmenés vagy hasmenéssel járó irritábilis bél szindróma esetén történő alkalmazásra

A BETEGTÁJÉKOZTATÓ TARTALMA

- 1. Mi az ENTEROSGEL®, és milyen betegségek esetén alkalmazható?
- 2. Tudnivalók az ENTEROSGEL® alkalmazása előtt
- 3. Hogyan kell alkalmazni az ENTEROSGEL®-t?
- 4. Lehetséges mellékhatások
- 5. Az ENTEROSGEL® tárolása
- 6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. MI AZ ENTEROSGEL®, ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Az ENTEROSGEL® orális szuszpenzió az alábbiak tüneti kezelésére szolgál:

- **akut hasmenés megbetegedések,**
- **hasmenéssel járó irritábilis bél szindróma (IBS-D).**

Az ENTEROSGEL® szerves ásványi alapú orális béladszorbens (enteroszorbens), amely képes adszorbeálni bizonyos toxikus és káros anyagokat a bélben (pl. endotoxinokat és enterotoxinokat). Ezeket fizikailag megköti a felületén, csökkentve a székletürítés gyakoriságát és lerövidítve a hasmenés időtartamát.

A széklettel együtt távozó ENTEROSGEL® eltávolítja a szervezetből a megkötött toxinokat és káros anyagokat, aminek jótékony hatása lehet a jelzett állapotok kezelésekor.

IBS-D-ben szenvedő betegeknél az ENTEROSGEL® enyhíti a hasmenést, a hasfájást, a puffadást és a székélési ingert.

Az ENTEROSGEL® nem tartalmaz tartósítószert, glutént, cukrot, édesítőszert, laktózt, zsírt, ízesítőszert, sem növényi vagy állati eredetű összetevőket.

2. TUDNIVALÓK AZ ENTEROSGEL® ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza az ENTEROSGEL®-t (ellenjavallatok):

- Ha egyéb, módosított (szabályozott) felszívódású gyógyszert is szed szájon át.
- Ha bélpangásban vagy bélbelzáródásban (bélcsavarodás miatti súlyos hasmenésben) szenved.
- A készítménnyel szembeni intolerancia esetén (korábbi alkalmazások alapján).

Figyelmezettsések és óvintézkedések

- Ne alkalmazza az ENTEROSGEL®-t szájon át szedett gyógyszerek alkalmazása előtt vagy után kevesebb mint 2 órával. Az ENTEROSGEL® befolyásolhatja egyes szájon át szedett gyógyszerek felszívódását. Ha

gyógyszert szed, akkor orvosát vagy gyógyszerészét is megkérdezheti az ENTEROSGEL® alkalmazásával kapcsolatban.

- Hosszan tartó hasmenés esetén az ENTEROSGEL® alkalmazása előtt orvoshoz kell fordulni az alapbetegség diagnosztizálása érdekében.
- Gyermekek esetén a hasmenés kezelését a szervezet dehidratálódásának megelőzése érdekében elegendő mennyiségű folyadék, illetve orális folyadékpótló oldat alkalmazásával kell kiegészíteni.
- Felnőttek esetén ajánlott az ENTEROSGEL®-kezelést folyadék vagy orális folyadékpótló oldat bevitelével kiegészíteni a megfelelő hidratálás biztosítása érdekében.
- A vitaminok, illetve tápanyagok esetleges adszorpciójának megelőzése érdekében ne lépje túl a kezelés ajánlott időtartamát, és ne alkalmazza a készítményt étkészskor.
- Ha a hasmenés két napnál tovább tart, orvoshoz kell fordulni.
- Láz, véres széklet, dehidratálódás jelei, 24 órán belül hat vagy több székelés, egyidejűleg hasmenés és hányás, illetve erős vagy állandó hasfájdás esetén mielőbb forduljon orvoshoz, különösen gyermekek esetében.
- Ne lépje túl sem a javasolt adagot, sem a kezelés javasolt időtartamát.
- Ha egyidejűleg egyéb béladszorben, például aktívszen-, agyag- vagy kauolintartalmú készítményt is alkalmaz, akkor kérje ki orvosa véleményét. Orvosa azt tanácsolhatja, hogy a másik készítményt ne alkalmazza az ENTEROSGEL®-lel együtt.
- Az ENTEROSGEL® alkalmazása nem javallott akut vegyszermérgezés vagy gyógyszer-túladagolás esetén.
- A csomagolásban feltüntetett lejáratidő után nem szabad felhasználni.

Az ENTEROSGEL® alkalmazható terhesség és szoptatás alatt. Amennyiben a terhesség vagy szoptatás alatt nem érzi jól magát, javasolt orvoshoz fordulni. Az ENTEROSGEL® alkalmazása előtt kérje ki orvosa véleményét.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI AZ ENTEROSGEL®-T?

- Miután első alkalommal híg székletet tapasztal, alkalmazza az ENTEROSGEL®-t a megfelelő mennyiségen.
- Az ENTEROSGEL®-t legalább 2 órával a szájón át szedett gyógyszerek alkalmazása előtt vagy után alkalmazza.
- Az ENTEROSGEL®-t legalább 1-2 órával étkezés előtt vagy után alkalmazza.
- Oldja fel az adagot szobahőmérsékletű vízben.
- A tasak csak közvetlenül a felnyitás után alkalmazható.
- Felnyitás és minden használat előtt jól rázza fel a tubust.
- A tubus a felnyitástól számított 30 napig használható



Életkor	Adagolás	Gyakorlás
1 év alatt	2,5 g (kb. ½ teáskanál) 7,5-15 ml vízben feloldva	Naponta 3-szor
1-6 év	5 g (kb. 1 teáskanál) 50-100 ml vízben feloldva	Naponta 3-szor
7-14 év	10 g (kb. 2 teáskanál) 50-100 ml vízben feloldva	Naponta 3-szor
15+ és felnőttek	15-22,5 g (kb. 1 leveleskanál vagy 1-1,5 tasak) 200 ml vízben feloldva	Naponta 3-szor



ENTEROSGEL®

Méregtelenítő készítmény

Az ENTEROSGEL®-kezelés időtartama:

- Akut hasmenés esetén 3-5 nap.
- Hasmenéssel járó irritábilis bél szindróma esetén legfeljebb 30 nap. Az ismételt használat közötti szünetnek legalább 3 napnak kell lennie.
- A hároméves kor alatti alkalmazást illetően javasolt kikérni az orvos véleményét.
- A kezelés kezdetén (az 1. napon) az első adag a kétszeresére növelhető, és minden székélés után újabb egyszeri adag adható. Ne lépje túl a 8 adagot az első napon.
- Krónikus hasmenés kezelésekor a széklet állágának és a székélés gyakoriságának megfelelően módosíthatja az adagolást. Híg széklet esetén kétszeres adag is alkalmazható legfeljebb napi 3 alkalommal, normál széklet esetén pedig naponta egyszer 1 adag is elegendő lehet. A napi 6 adagot ne lépje túl.
- Ha 1-2 napig nincs széklete, akkor szakítsa meg az ENTEROSGEL® alkalmazását, növelte a folyadékbevitelt, és a következő székélés után folytassa a kezelést.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Székrekedés, émelygés (hányinger)

5. AZ ENTEROSGEL® TÁROLÁSA

- A csomagoláson feltüntetett lejáratú idő után az ENTEROSGEL®-t tilos alkalmazni.
- Gyermekkel elől elzárva tartandó.
- Az ENTEROSGEL®-t 4 és 30 °C közötti hőmérsékleten kell tartani.
- Nem fagyasztható.
- Óvja a túl magas hőmérséklettől és a közvetlen napfénytől.
- A csomagoláson feltüntetett lejáratú idő a megfelelően tárolt, bontatlan termékre érvényes.

Tasak

- A felnyitott tasak csak egyszer alkalmazható.
- A tasakok egyszeri használatra szolgálnak; a tasakot csak közvetlenül az alkalmazás előtt nyissa fel.
- A mikrobás szennyeződés megelőzése érdekében ne alkalmazza újra a részlegesen felhasznált tasakokat.

Tubus

- Felnyitás és minden használat után szilárdan zárja vissza a tubus kupakját a kiszáradás és a mikrobás szennyeződés megelőzése érdekében.

Az ENTEROSGEL® kinyomásakor kis mennyiségű folyadék is távozhat a tubusból vagy a tasakból.

6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Összetétel: polimetilsziloxán-polihidrát (a metil-kovasav hidrogéje) – 70%, tisztított víz – 30%.

Kiszerelések

- ENTEROSGEL® orális szuszpenzió
- 225 g-os tubus
- 90 g-os tubus
- 15 g-os tasak (10 tasakos csomagolás)

ÁRTALMATLANÍTÁS

A felhasználatlan ENTEROSGEL® ártalmatlanítása nem igényel különleges intézkedést. A készítmény biztonságosan a háztartási hulladékba dobható. A csomagolás újrahasznosítható.

Eltarthatóság: a csomagoláson jelzett időpontig

Az ENTEROSGEL® készítményrel kapcsolatos kérdéseit az info@enterosgel.eu címre küldheti e-mailben.

A jelen betegtájékoztató egyéb nyelvű változatai megtalálhatók a www.enterosgel.eu címen.

GYÁRTÓ:



Bioline Products s.r.o.

Krakovská 1338/10,
110 00 Praha, Cseh Köztársaság
www.enterosgel.eu

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZO:

Anima-Terra Kft.
Budapest, 1121 Ágnes út 25.
www.enterosgel.hu

A BETEGTÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTETT VÁLTOZATÁNAK DÁTUMA:

08.08.2022

VÁLTOZAT: TUV/IFU/HU/NB/2

A CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETETT SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA:



Tilos újrafelhasználni



Tanúsított orvosi eszköz



Minőségmegőrzési idő



Eldobható csomagolás



Tételkód



A használt csomagolást helyezze megfelelő hulladékgyűjtő tartályba. A csomagolás újrahasznosítható.



Gyártó



A csomagolásért be lett fizetve a megfelelő illeték a meghatalmazott csomagoló vállalat számára.



Olvassa el a használati útmutatót



Óvja a közvetlen napfénytől



Hőmérsékleti határértékek
30°C
4°C

CE 0123

Orvosi eszköz Ila osztály



Agente detossificante

**Adsorbente gastrointestinale indicato per il trattamento della
diarrea acuta e della Sindrome dell'Intestino Irritabile
con diarrea**



COSA È CONTENUTO IN QUESTO FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

1. Cos'è ENTEROSGEL® e a cosa serve
2. Cosa bisogna sapere prima di assumere ENTEROSGEL®
3. Come assumere ENTEROSGEL®
4. Possibili effetti collaterali
5. Come conservare ENTEROSGEL®
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. COS'È ENTEROSGEL® E A COSA SERVE

ENTEROSGEL® è una sospensione orale indicata per:

- il trattamento sintomatico della diarrea acuta
- il trattamento della Sindrome dell'Intestino Irritabile con diarrea (IBS-D)

ENTEROSGEL® è un adsorbente intestinale orale (enterosorbente) composto da un minerale organico, in grado di adsorbire nell'intestino alcune sostanze tossiche e nocive (per es. endotossine e enterotossine), che lega fisicamente sulla propria superficie, riducendo la frequenza dei movimenti intestinali e la durata della diarrea.

ENTEROSGEL® viene eliminato attraverso le feci, rimuovendo le tossine e le sostanze nocive adsorbite, con effetti benefici nel trattamento delle condizioni indicate.

ENTEROSGEL® nei casi di Sindrome dell'Intestino Irritabile con diarrea (IBS-D) allevia i sintomi di: diarrea, dolori addominali, gonfiore addominale e urgenza all'evacuazione.

ENTEROSGEL® non contiene conservanti, glutine, zucchero, dolcificanti, lattosio, grassi, aromi, ingredienti di origine vegetale o animale.

2. COSA BISOGNA SAPERE PRIMA DI ASSUMERE ENTEROSGEL®

NON USARE ENTEROSGEL® (CONTROINDICAZIONI):

- se si stanno assumendo medicinali a rilascio modificato per via orale
- nel caso di atonia intestinale o di occlusione intestinale (stitichezza grave dovuta a ostruzione intestinale)
- in caso di intolleranza al prodotto accertata durante un precedente utilizzo

Avvertenze e precauzioni

- Non assumere ENTEROSGEL® meno di due ore prima o dopo aver assunto farmaci per via orale. ENTEROSGEL® può interferire con l'assorbimento di alcuni farmaci somministrati per via orale. Se state assumendo farmaci, chiedete consiglio al vostro medico o al farmacista prima di assumere ENTEROSGEL®.

• In caso di diarrea prolungata, prima di assumere ENTEROSGEL®, è necessario consultare il medico per una corretta diagnosi della condizione di partenza.

• Nei bambini, nel trattamento della diarrea, è consigliabile accompagnare la somministrazione di ENTEROSGEL® con adeguata quantità di liquidi, eventualmente di soluzione reidratante orale, per prevenire fenomeni di disidratazione.

- Negli adulti si consiglia, durante il trattamento con ENTEROSGEL®, l'assunzione di liquidi o di soluzione reidratante orale al fine di garantire una corretta idratazione.
- Non superare il periodo di trattamento consigliato e non assumere ENTEROSGEL® contemporaneamente ad alimenti per non interferire con l'assorbimento di vitamine o di sostanze nutritive.
- Se la diarrea dura più di 2 giorni, è necessario consultare il medico.
- In presenza di febbre, sangue nelle feci, sintomi di disidratazione, 6 o più evacuazioni nelle ultime 24 ore, diarrea e vomito, oppure dolori addominali forti e persistenti, consultare il medico, soprattutto se si tratta di bambini.
- Non superare la dose consigliata e non superare il periodo di trattamento consigliato.
- Consultare il medico se si stanno assumendo altri adsorbenti intestinali, per esempio preparati che contengono carbone attivo, argilla o caolino. Il medico potrebbe consigliare di non utilizzarli contemporaneamente a ENTEROSGEL®.
- ENTEROSGEL® non è indicato per l'uso in caso di intossicazione chimica acuta o sovradosaggio di farmaci.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

ENTEROSGEL® può essere assunto anche durante la gravidanza e l'allattamento. Si consiglia di consultare il medico in caso di malessere durante la gravidanza o l'allattamento. Consultare il medico prima di assumere ENTEROSGEL®.

3. COME ASSUMERE ENTEROSGEL®

- Assumere la dose necessaria di ENTEROSGEL® appena si osservano feci molli.
- Assumere ENTEROSGEL® almeno 2 ore prima o dopo l'assunzione di farmaci per via orale.
- Assumere ENTEROSGEL® almeno 1-2 ore prima o dopo il pasto.
- Diluire la dose di ENTEROSGEL® in acqua a temperatura ambiente, prima della somministrazione.
- Agitare bene il tubo prima dell'apertura e prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare il tubo entro 30 giorni dall'apertura.



Età	Dosaggio	Frequenza
Fino a 1 anno	2,5 g (circa mezzo cucchiaino) da diluire in 7,5-15 ml di acqua	3 volte al giorno
1-6 anni	5 g (circa 1 cucchiaino) da diluire in 50-100 ml di acqua	3 volte al giorno
7-14 anni	10 g (circa 2 cucchiaini) da diluire in 50-100 ml di acqua	3 volte al giorno
15+ e adulti	da 15 g a 22,5 g (circa 1 cucchiaio) da diluire in 200 ml di acqua	3 volte al giorno



Durata del trattamento con ENTEROSGEL®

- 3-5 giorni in caso di diarrea acuta.
- Fino a 30 giorni nei casi di Sindrome dell'Intestino Irritabile con diarrea, con un intervallo tra un ciclo di trattamento e l'altro di almeno 3 giorni.
- Consultare il medico prima di somministrare a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- All'inizio del trattamento (Giorno 1) è possibile raddoppiare la prima dose e poi continuare con una singola dose dopo ogni evacuazione, fino ad un massimo di 8 dosi nella prima giornata.
- Durante il trattamento della diarrea cronica è possibile adattare il dosaggio in base alla consistenza delle feci e alla frequenza delle scariche diarrhoeiche.
- La somministrazione può essere aumentata a 2 dosi, fino a 3 volte al giorno, in caso di feci liquide o ridotta a 1 dose al giorno, se la consistenza delle feci è normale. È possibile assumere un massimo di 6 dosi al giorno.
- Interrompere il trattamento con ENTEROSGEL® se non si hanno evacuazioni per 1-2 giorni; aumentare l'assunzione di acqua e riprendere il trattamento dopo la successiva evacuazione

4. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Stitichezza, nausea.

5. COME CONSERVARE ENTEROSGEL®

- ENTEROSGEL® non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare ENTEROSGEL® a una temperatura compresa tra 4°C e 30°C.
- Proteggere dal gelo.
- Non esporre a eccessivo calore né alla luce diretta del sole.
- La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto integro correttamente conservato.

Bustine

- Ogni bustina può essere utilizzata una sola volta dopo l'apertura.
- Le bustine sono monouso e vanno aperte immediatamente prima dell'utilizzo.
- Non riutilizzare le bustine parzialmente usate onde evitare la contaminazione micobica.

Tubo

- Dopo l'apertura e dopo ogni utilizzo richiudere bene il tappo del tubo per evitare l'essiccazione e la contaminazione micobica del prodotto.

Quando ENTEROSGEL® viene erogato dal tubo può fuoriuscire una piccola quantità di liquido.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Composizione: Polimetilsilossano Poliidrato (idrogel dell'acido metilsilicico) 70 %, acqua purificata 30 %.

Dimensioni della confezione

- ENTEROSGEL® sospensione orale
– Tubo 225 g
– Tubo 90 g
– Bustina 15 g (10 bustine per confezione)

SMALTIMENTO

Non ci sono misure particolari per lo smaltimento di ENTEROSGEL® non utilizzato. Il prodotto può essere gettato senza rischi nei rifiuti domestici. La confezione può essere riciclata.

Scadenza: fino alla data riportata sulla confezione.

Per eventuali ulteriori domande sull'utilizzo di ENTEROSGEL® potete rivolgervi per e-mail a: info@enterosgel.eu.

Il presente foglietto illustrativo è disponibile anche in altre lingue sul sito www.enterosgel.eu.

FABBRICANTE:



Bioline Products s.r.o.
Královská 1338/10,
110 00 Praga, Repubblica Ceca
www.enterosgel.eu

Distributore esclusivo per l'Italia



Guna S.p.a.
Milano, Italia
www.guna.it

DATA DELLA VERSIONE AGGIORNATA DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:
08.02.2022

VERSIONE: TUV/IFU/IT/NB/3

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLICI GRAFICI SULLA CONFEZIONE:



Non riutilizzare



Gettare la confezione usata nell'apposito contenitore per i rifiuti.



Data di scadenza



Astuccio di carta (PAP 21). Raccolta differenziata.



LOT

Lotto



Per questo imballaggio è stata pagata una commissione a un'azienda autorizzata alla gestione degli imballaggi.



Fabbricante



Leggere le istruzioni



Intervallo di temperatura
4°C - 30°C



Conservare al riparo dalla luce diretta del sole



Dispositivo medico certificato

CE 0123

Dispositivo medico di classe IIa



Adsorbant gastrointestinal pentru utilizare în caz de diaree acută sau în caz de sindrom de colon iritabil cu diaree



Preparat de detoxifiere

CE INFORMAȚII GĂSITI ÎN ACEST PROSPECT

- 1.Ce este ENTEROSGEL® și pentru ce se utilizează
- 2.Ce trebuie să știi înainte să începeți să utilizați ENTEROSGEL®
- 3.Cum să luati ENTEROSGEL®
- 4.Reacții adverse posibile
- 5.Cum se păstrează ENTEROSGEL®
- 6.Continutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE ENTEROSGEL® ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

ENTEROSGEL® este o suspensie perorală indicată pentru:

- tratamentul simptomatic al diareei acute,
- sindromul intestinului iritabil cu diaree SII-D.

ENTEROSGEL® este un adsorbant intestinal oral (enterosorbent) bazat pe un mineral cu capacitate de adsorbție la unele substanțe toxice și nocive din intestin (de ex. endotoxine, enterotoxine) pe care le leagă fizic pe suprafața sa, putând astfel reduce frecvența scaunelor și durata diareei.

ENTEROSGEL® se elimină din organism prin scaun și astfel elimină toxinele adsorbite și substanțele nocive, lucru ce poate avea un efect benefic în tratarea afecțiunilor indicate.

ENTEROSGEL® calmează diareea, durerile abdominale, balonarea și nevoia de defecare la pacienții cu SII-D.

ENTEROSGEL® nu conține conservanți, gluten, zahăr, îndulcitori, lactoză, grăsimi, arome artificiale, ingrediente de origine vegetală sau animală.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTII ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEȚI SĂ UTILIZAȚI ENTEROSGEL®

A nu se administra ENTEROSGEL® (contraindicări):

- Dacă luați simultan medicamente pe cale orală cu eliberare modificată (controlată).
- În cazul în care suferiți suferiți de atonie intestinală sau de ocluzie intestinală (de constipație gravă din motive de ocluzie intestinală).
- În cazul intoleranței la administrarea preparatului în trecut.

Avertismente și măsuri preventive

- A nu se lăsa ENTEROSGEL® cu cel puțin două ore înainte sau după administrarea pe cale orală a medicamentului. ENTEROSGEL® poate afecta absorția unor medicamente care se administrează pe cale orală. Dacă luați anumite medicamente, vă puteți consulta, de asemenea, cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre administrarea preparatului ENTEROSGEL®.
- În cazul diareei de lungă durată, este necesar să consultați un medic înainte de a lua preparatul ENTEROSGEL® pentru a stabili un diagnostic al bolii de bază.
- La copii, tratamentul diareei trebuie să fie suplimentat prin administrarea

unei cantități suficiente de lichide sau a unei soluții de hidratare perorală, pentru a evita deshidratarea.

- La adulții, în timpul tratamentului cu preparatul ENTEROSGEL® se recomandă consumul de lichide sau o soluție de hidratare perorală pentru a asigura o rehidratare adecvată.
- Nu depășiți durata tratamentului recomandată și nu administrați preparatul împreună cu mâncare pentru a evita o posibilă deficiență de vitamine și de nutrienți.
- Dacă diareea durează mai mult de două zile, este necesar să consultați un medic.
- În cazul în care aveți febră, sânge în scaun, semne de deshidratare, șase sau mai multe scaune în ultimele 24 de ore, în același timp diaree și vărsături, dureri de stomac puternice sau permanente atunci cereți asistență medicală căt mai curând posibil, mai ales atunci când este vorba de copii.
- Nu depășiți doza recomandată și nu depășiți durata recomandată a tratamentului.
- Vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră dacă la ora actuală luati și alti adsorbanți intestinali, de exemplu preparate care contin cărbune activat, argilă sau caolină. Medicul dumneavoastră vă va sfătuī ce n-ar trebui să luati împreună cu preparatul ENTEROSGEL®.
- ENTEROSGEL® nu este indicat pentru cazuri de intoxicație chimică acută sau pentru supradozajul medicamentelor.
- A nu se utilizează după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

ENTEROSGEL® poate fi utilizat în timpul sarcinii și alăptării. Este recomandat să consultați medicul dacă vă simțiți rău în timpul sarcinii sau alăptării. Vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a lua preparatul ENTEROSGEL®.

3. CUM SĂ LUĂTI ENTEROSGEL®

- Luati doza necesară de ENTEROSGEL® după primul scaun moale.
- Luati ENTEROSGEL® cu cel puțin 2 ore înainte sau după administrarea medicamentului peroral.
- Luati ENTEROSGEL® cu cel puțin 1–2 ore înainte sau după masă.
- Înainte de administrare diluați doza în apă la temperatura camerei.
- Folosiți piculețul imediat după deschidere.
- Agitați bine tubul înainte de deschidere și înainte de fiecare utilizare.
- Folosiți tubul în 30 de zile de la deschidere.



Vârstă	Dozare	Cât de des
Până la 1 an	2,5 g (≈1/2 lingurită) a se dilua în 7,5-15 ml de apă.	de 3 ori pe zi
1-6 ani	5 g (≈ 1 lingurită) a se dilua în 50-100 ml de apă.	de 3 ori pe zi
7-14 ani	10 g (≈ 2 lingurițe) a se dilua în 50-100 ml de apă.	de 3 ori pe zi
15+ și adulții	15 g până la 22,5 g (≈ 1 lingură sau 1-1,5 din plic) a se dilua în 200 ml de apă.	de 3 ori pe zi



ENTEROSGEL®

Preparat de detoxifiere

Durata tratamentului cu ENTEROSGEL® este:

- 3-5 zile în caz de diaree acută,
- Până la 30 de zile pentru sindromul de colon iritabil cu diaree. Pauza dintre utilizarea repetată trebuie să fie de cel puțin 3 zile.
- Se recomandă consultarea medicului înainte de utilizare la copiii sub 3 ani.
- La începutul tratamentului (Ziua 1) puteți dubla prima doză și apoi continuați cu o singură doză după fiecare scaun. Maximum opt doze în prima zi.
- În timpul tratamentului diareei cronice puteți adapta dozarea în așa fel încât să corespundă consistenței și frecvenței scaunului. Este posibil să se administreze chiar doză dublă de 3 ori pe zi în cazul în care scaunul este subțire, sau să se reducă la o singură doză o dată pe zi în cazul în care scaunul este normal. Se pot administra maxim 6 doze pe zi.
- Întrerupeți tratamentul cu preparatul ENTEROSGEL® dacă nu aveți scaun timp de 1-2 zile, măriți aportul de apă și continuați tratamentul după un alt scaun.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Constipație, senzație de greață

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ENTEROSGEL®

- ENTEROSGEL® nu trebuie să fie utilizat după termenul de expirare indicat pe ambalaj.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A se păstra ENTEROSGEL® la temperaturi de la 4 °C până la 30 °C.
- A se feri de îngheț.
- A nu se expune la căldură excesivă și a se feri de razele directe ale soarelui.
- Data expirării indicată pe ambalaj se referă la produsul nedeschis, depozitat în mod corespunzător.

Pliculețe

- După deschidere, fiecare plic poate fi utilizat numai o singură dată.
- Plicurile sunt de unică folosință și trebuie să se deschidă imediat înainte de utilizare.
- A nu se reutiliza plicurile parțial utilizate ca să evitați contaminarea microbiană.

Tuburi

- După deschidere și după fiecare utilizare închideți bine capacul tubului în așa fel încât să nu se producă uscarea și contaminarea microbială.

La stoarcerea preparatului ENTEROSGEL® din tub sau din plic, poate apărea o cantitate mică de lichid.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Compoziție: Polimetilsiloxan polihidrat (hidrogel de acid metilsilicic) – 70 %, apă purificată – 30 %.

Mărimea ambalajului

- ENTEROSGEL® suspensie perorală
- Tub de 225 g
- Tub de 90 g
- Plic de 15 g (10 plicuri în ambalaj)

LICHIDARE

Lichidarea preparatului ENTEROSGEL® neutilizat nu este supusă măsurilor speciale. Preparatul poate fi aruncat în siguranță în deșeurile menajere. Ambalajul este reciclabil.

Perioada de valabilitate:

până la data indicată pe ambalaj

Dacă aveți alte întrebări suplimentare cu privire la utilizarea preparatului ENTEROSGEL®, adresați-vă vă rog prin e-mail: info@enterosgel.eu.

Prezentul prospect este la dispoziție și în alte limbi la www.enterosgel.eu.

PRODUCĂTOR:



Bioline Products s.r.o.
Krakovská 1338/10,
110 00 Praha, Republica Cehă
www.enterosgel.eu

DISTRIBUITOR:

SC NANO BIO MEDICAL SRL
Intrarea Armașului,
nr. 12, ap. 2, sector 1,
București, România, 010484
Telefon: 021.210.52.40
office@enterosgel.ro
www.enterosgel.ro

DATA VERSIUNII ACTUALIZATE A PROSPECTULUI: 08.08.2022

VERSIUNE: TUV/IFU/RO/NB/2

EXPLICAREA SIMBOLURILOR GRAFICE DE PE AMBALAJ:



De unică folosință



Ambalaj de unică folosință



Valabilitatea minimă



Aruncați ambalajul în containerul de deșeuri corespunzător. Ambalajul este reciclabil.



Lot



Taxa pentru compania autorizată de ambalare a fost plătită pentru acest ambalaj.



Producător



A se tine departe de lumina directă a soarelui.



Vă rog să citiți prospectul cu atenție



Intervalul de temperaturi



Dispozitiv medical certificat

CE 0123

Dispozitiv medical clasa IIa



Sredstvo za razstrupljanje

Gastrointestinalni adsorbent za uporabo pri akutni driski in kročni driski, povezani s sindromom razdražljivega črevesja.

SI

KAJ JE VSEBINA TEH NAVODIL ZA UPORABO

- 1. Kaj je medicinski pripomoček ENTEROSGEL® in za kaj se uporablja
- 2. Kaj morate vedeti pred začetkom uporabe izdelka ENTEROSGEL®
- 3. Kako se ENTEROSGEL® uporablja
- 4. Možni neželeni učinki
- 5. Shranjevanje izdelka ENTEROSGEL®
- 6. Vsebina embalaže in ostale informacije

1. KAJ JE MEDICINSKI PRIPOMOČEK ENTEROSGEL® IN ZA KAJ SE UPORABLJA

ENTEROSGEL® je peroralna suspenzija, indicirana za:

- simptomatsko zdravljenje akutne driske,
- sindrom razdražljivega črevesja z drisko (IBS-D).

ENTEROSGEL® je peroralni črevesni adsorbent (enterosorbent). Temelji na osnovi organskega minerala s sposobnostjo adsorpcije za nekatere strupene in škodljive snovi v črevesju (npr. endotoksine, enterotoksine), ki jih fizično veže na svojo površino in zmanjšuje pogostost odvajanja blata ter trajanje driske.

ENTEROSGEL® se iz telesa izloča z blatom in tako iz njega odstranjuje adsorbirane toksine in škodljive snovi, kar ima lahko blagodejen učinek pri zdravljenju indiciranih stanj.

ENTEROSGEL® blaži drisko, bolečine v trebuhi, napenjanje in nujno potrebo po odvajjanju blata pri pacientih z IBS-D.

ENTEROSGEL® ne vsebuje konzervansov, glutena, sladkorja, laktoze, maščob, ojačevalcev okusa, niti sestavin rastlinskega ali živalskega izvora.

2. KAJ MORATE VEDETI PRED ZAČETKOM UPORABE IZDELKA ENTEROSGEL®

Ne uporabljajte izdelka ENTEROSGEL® (kontraindikacije):

- Če že uporabljate peroralna zdravila s prirejenim sproščanjem.
- Če trpite zaradi črevesne atonije (resno zaprtje zaradi izgube delovanja gladkega mišičja) ali obstrukcije črevesja.
- V primeru intolerance pri predhodni uporabi izdelka.

Opozorila in ukrepi

- Ne uporabljajte izdelka ENTEROSGEL® manj kot 2 uri pred ali po uporabi peroralnih zdravil. ENTEROSGEL® lahko vpliva na absorbiranje nekaterih zdravil, ki se uživajo skozi usta. Če jemljete kakršnakoli zdravila, se o uporabi izdelka ENTEROSGEL® posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.
- V primeru dolgotrajne driske se pred uporabo izdelka ENTEROSGEL® nujno posvetujte z zdravnikom, da določi diagnozo osnovne bolezni.
- Pri otrocih naj bo zdravljenje driske podprtjo z uživanjem zadostne količine vode ali rehidracijskega napitka, da preprečite morebitno dehidracijo.

• Pri odraslih se med zdravljenjem z izdelkom ENTEROSGEL® priporoča uživanje zadostne količine tekočin ali peroralne rehidracijske raztopine za zagotovitev ustrezne rehidracije.

• Ne prekoračite priporočenega trajanja zdravljenja in ne uživajte izdelka ob jedi, da se izognete morebitni adsorpciji vitaminov ali hranil in s tem pri-manjkljaju le-teh.

• Če simptomi driske trajajo dlje kot 2 dni, se posvetujte s svojim zdravnikom.

• Če se pojavijo vročina, kri v blatu, znaki dehidracije, šest ali več odvajanj v zadnjih 24 urah sočasno z drisko, bruhanjem in močno ali trajno bolečino v trebuhi, čim hitreje poščite pomoč zdravnika, predvsem v primeru, ko je ogroženo zdravje otroka.

• Ne prekoračite priporočenega odmerka in ne prekoračite priporočenega trajanja zdravljenja.

• Če že uporabljate druge črevesne adsorbente, na primer pripravke, ki vsebujejo aktivno oglje, glinu ali kaolin, se pogovorite s svojim zdravnikom. Ta vam bo morda svetoval, da le-teh ne uporabljate sočasno z izdelkom ENTEROSGEL®.

• ENTEROSGEL® ni indiciran za uporabo v primeru akutne kemične zastrupitve ali predoziranja zdravil.

• Ne uporabljajte po izteku roka uporabe, ki je naveden na embalaži.

ENTEROSGEL® se lahko uporablja med nosečnostjo in dojenjem. Če se med nosečnostjo ali dojenjem ne počutite dobro, se o tem posvetujte s svojim zdravnikom. Pred uporabo izdelka ENTEROSGEL® se posvetujte s svojim zdravnikom.

3. KAKO SE ENTEROSGEL® UPORABLJA

- Potreben odmerek izdelka ENTEROSGEL® zaužijte po prvem redkem blatu.
- ENTEROSGEL® zaužijte najmanj 2 uri pred ali po uporabi peroralnih zdravil.
- ENTEROSGEL® zaužijte najmanj 1-2 uri pred jedjo ali po njej.
- Pred zaužitjem ustreznen odmerek zmešajte v kozarcu vode sobne temperature.
- Vrečko porabite takoj po odprtju.
- Pred odprtjem in vsako uporabo tubo dobro pretresite.
- Tubo porabite v 30 dneh od odprtja.



Starost	Odmerek	Kako pogosto
Do 1 leta	2,5 g (≈ 1/2 čajne žličke) razredčite v 7,5–15 ml vode.	3-krat na dan
1–6 let	5 g (≈ 1 čajna žlička) razredčite v 50–100 ml vode.	3-krat na dan
7–14 let	10 g (≈ 2 čajni žlički) razredčite v 50–100 ml vode.	3-krat na dan
15+ in odrasli	15 do 22,5 g (≈ 1 jušna žlička ali 1–1,5 vrečke) razredčite v 200 ml vode.	3-krat na dan



ENTEROSGEL®

Sredstvo za razstrupljanje

Trajanje zdravljenja z medicinskim pripomočkom ENTEROSGEL® je:

- 3–5 dni pri akutni driski.
- Do 30 dni pri sindromu razdražljivega črevesja z drisko. Premor med ponovno uporabo naj bo vsaj 3 dni.
- Pri otrocih do 3 let je pred uporabo priporočen posvet z zdravnikom.
- Na začetku zdravljenja (1. dan) lahko prvi odmerek podvajajte in nato nadaljujete z enojnim odmerkom po vsakem odvajanju blata. Prvi dan zaužijte največ osem odmerkov.
- Med zdravljenjem kronične driske lahko odmerek prilagajate tako, da s tem zagotovite redno odvajanje blata. Lahko zaužijete do dvakratnega odmerek 3-krat na dan, če je blato redko, ali pa količino zmanjšate na enojen odmerek 1-krat na dan, ko je blato normalno. Zaužijete lahko največ šest odmerkov na dan.
- Zdravljenje z izdelkom ENTEROSGEL® prekinite, če 1-2 dni niste odvajali, povečajte vnos vode in z jemanjem nadaljujte po naslednjem odvajanju.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Zaprtje, slabost.

5. SHRANJEVANJE IZDELKA ENTEROSGEL®

- ENTEROSGELA® ne uporabljajte po izteku roka uporabe, ki je naveden na embalaži.
- Hranite izven dosega otrok.
- ENTEROSGEL® hranite na temperaturi od 4 °C do 30 °C.
- Izdelka ne izpostavljajte mrazu.
- Ne izpostavljajte prekomerni vročini ali direktni sončni svetlobi.
- Rok uporabe, ki je naveden na embalaži, velja za ustrezno shranjen, neodprt izdelek.

Vrečke

- Po odprtju je vsaka vrečka namenjena za enkratno uporabo.
- Vrečke je potrebno odpreti tik pred zaužitjem, po uporabi pa jih lahko zavrete.
- Vsebine delno porabljenih vrečk ne uživajte več, saj izdelek ni več mikrobiološko neoporečen.

Tube

- Po odprtju in vsaki uporabi trdno privijte pokrovček nazaj na tubo, da se vsebina ne bi posušila in da preprečite vdor mikrobov.

Pri iziskanju pripravka ENTEROSGEL® iz tube ali vrečke se lahko pojavi majhna količina tekočine.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN OSTALE INFORMACIJE

Sestava: polimetilsilosan polihidrat (hidrogel metilsilikijeve kislina) – 70 %, prečiščena voda – 30 %.

Velikost pakiranja

- ENTEROSGEL® peroralna suspenzija
- Tuba 225 g
 - Tuba 90 g
 - Vrečka 15 g (10 vrečk v pakiranju)

ENTEROSGEL® KOT ODPADEK

Odlaganje izdelka ENTEROSGEL® ne zahteva nobenih posebnih ukrepov. Izdelek lahko varno odvržete z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Embalaža je primerna za recikliranje.

Rok trajanja: do datuma, navedenega na embalaži

Če imate še kakšna vprašanja v zvezi z uporabo pripravka ENTEROSGEL®, se na nas obrnite preko e-pošte na naslov: info@enterosgel.eu.

Ta navodila za uporabo so na voljo tudi v drugih jezikih na www.enterosgel.eu.

PROIZVJAJALEC:



Boline Products s.r.o.
Krakovská 1338/10
110 00 Praha, Češka republika
www.enterosgel.eu

GENERALNI UVOZNIK ZA SLOVENIJO:

PHARMAZINE d.o.o.
Ukmarjeva ulica 6
1000 LJUBLJANA
www.enterosgel.si
info@enterosgel.si
www.pharmazine.si

DATUM ZADNJE REVIZIJE NAVODIL: 08.08.2022

RAZLIČICA: TUV/IFU/SL/NB/2

POJASNILA GRAFIČNIH OZNAK NA EMBALAŽI:

	Ni primerno za večkratno zaporedno uporabo.	Embalaga za enkratno uporabo
	Rok trajanja najmanj do	Uporabljeno embalažo odvržite v ustrezni zaboljnik za odpadke. Embalaža je primerna za recikliranje.
	LOT	Serija
	Proizvajalec	Za embalažo je bila plačana embalažna pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.
	Preberite navodila	
	Temperaturni razpon	Ne hranite na direktni sončni svetlobi
	Klinično potrjen medicinski pripomoček	

Medicinski pripomoček razreda IIa