



Detoxikační přípravek

**CZ** Gastrointestinální adsorbent pro užívání při akutním průjmu a syndromu dráždivého tračníku s průjmem

## CO JE OBSAHEM TÉTO PŘÍBALOVÉ INFORMACE

1. Co je ENTEROSGEL® a k čemu se používá
2. Co potřebujete vědět, než začnete ENTEROSGEL® užívat
3. Jak se ENTEROSGEL® užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ENTEROSGEL® uchovávat
6. Obsah balení a další informace

## 1. CO JE ENTEROSGEL® A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

**ENTEROSGEL® je perorální suspenze indikovaná pro:**

- **symptomatickou léčbu akutních průjmových onemocnění,**
- **syndrom dráždivého tračníku s průjmem (IBS-D).**

ENTEROSGEL® je perorální střešní adsorbent (enterosorbent) na bázi organického minerálu s adsorpční schopností vůči některým toxickým a škodlivým látkám ve střevě (např. endotoxiny, enterotoxiny), které fyzicky váže na svůj povrch, a snižuje tak četnost vyprazdňování stolice a trvání průjmu.

ENTEROSGEL® odchází z těla se stolicí a tím odstraňuje adsorbované toxiny a škodlivé látky, což může mít blahodárny účinek při léčbě indikovaných stavů.

ENTEROSGEL® zmírňuje průjem, bolesti břicha, nadýmání a nutkání k vyprázdnění u pacientů s IBS-D.

ENTEROSGEL® neobsahuje konzervanty, lepek, cukr, sladidla, laktózu, tuky, ochucovačlá, ingredience rostlinného nebo živočišného původu.

## 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ENTEROSGEL® POUŽÍVAT

**Nepoužívejte ENTEROSGEL® (kontraindikace):**

- Jestliže současně užíváte perorální léčiva s modifikovaným (řízeným) uvolňováním.
- Trpíte-li střešní atonií nebo střešní neprůchodností (závažnou zácpou z důvodu střešní obstrukce).
- V případě intolerance přípravku během užívání v minulosti.

**Upozornění a opatření**

- Neužívejte ENTEROSGEL® méně než dvě hodiny před užitím nebo po užití perorálního léku. ENTEROSGEL® může ovlivnit absorpci některých léčiv, které se podávají perorálně. Jestliže užíváte nějaké léky, můžete se také

poradit ohledně použití přípravku ENTEROSGEL® se svým lékařem nebo lékárníkem.

- V případě dlouhotrvajícího průjmu je nutné se před užíváním přípravku ENTEROSGEL® poradit s lékařem za účelem stanovení diagnózy základního onemocnění.
- U dětí by léčba průjmu měla být doplněna podáním dostatečného množství tekutin, případně perorálního rehydratačního roztoku, aby nedošlo k dehydrataci.
- U dospělých osob se doporučuje během léčby přípravkem ENTEROSGEL® příjem tekutin nebo perorální rehydratační roztok pro zajištění správné rehydratace.
- Nepřekračujte doporučenou dobu léčby a neužívejte společně s jídlem, abyste se vyhnuli možné adsorpci vitaminů nebo živin.
- Pokud průjem trvá více než dva dny, je nutné se poradit s lékařem.
- Pokud máte horečku, krev ve stolici, známky dehydratace, šest nebo více stolic během posledních 24 hodin, současně průjem a zvracení, silné nebo neustálé bolesti břicha, vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc, zejména jde-li o děti.
- Nepřekračujte doporučenou dávku a nepřekračujte doporučenou dobu léčby.
- Promluvte si, prosím, se svým lékařem, jestliže v současné době užíváte jiné střešní adsorbenty, například přípravky, které obsahují aktivní uhlí, jííl nebo kaolín. Váš lékař vám možná poradí, abyste je neužívali současně s přípravkem ENTEROSGEL®.
- ENTEROSGEL® není indikován k užívání v případě akutní chemické otravy nebo předávkování léky.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

**ENTEROSGEL® lze užívat během těhotenství a kojení.** Je doporučeno poradit se s svým lékařem, pokud se během těhotenství nebo kojení necítíte dobře. Poradte se, prosím, se svým lékařem před užitím přípravku ENTEROSGEL®.

## 3. JAK SE ENTEROSGEL® UŽÍVÁ

- Užíjte potřebnou dávku přípravku ENTEROSGEL® po první řídké stolici.
- Užívejte ENTEROSGEL® minimálně 2 hodiny před užitím nebo po užití perorálního léku.
- Užívejte ENTEROSGEL® minimálně 1–2 hodiny před jídlem nebo po něm.
- Před podáním rozřeďte dávku ve vodě pokojové teploty.
- Sáček použijte ihned po otevření.
- Tubu dobře protřepejte před otevřením a každým použitím.
- Tubu použijte do 30 dnů od otevření.



Věk	Dávkování	Jak často
<b>Do 1 roku</b>	2,5 g (≈1/2 čajové lžičky) zředit v 7,5-15 ml vody.	3x denně
<b>1–6 let</b>	5 g (≈ 1 čajová lžička) zředit v 50-100 ml vody.	3x denně
<b>7–14 let</b>	10 g (≈ 2 čajové lžičky) zředit v 50-100 ml vody.	3x denně
<b>15+ a dospělí</b>	15 g až 22,5 g (≈ 1 polévková lžice nebo 1–1,5 sáčku) zředit v 200 ml vody.	3x denně

## Doba léčby přípravkem ENTEROSGEL® je:

- 3–5 dnů při akutním průjmu,
- Až 30 dnů u syndromu dráždivého tračníku s průjmem. Pauza mezi opětovným užíváním min. 3 dny.
- Před použitím u dětí do tří let je doporučeno poradit se s lékařem.
- Na začátku léčby (Den 1) můžete zdvojnásobit první dávku, a pak pokračovat s jednotlivou dávkou po každé stolici. První den maximálně osm dávek.
- Během léčby chronického průjmu můžete upravovat dávkování tak, aby odpovídalo konzistenci a četnosti stolice. Je možné užít dvojnásobnou dávku až 3x denně, pokud je stolice řídká, nebo snížit na jednu dávku 1x denně, jestliže je stolice normální. Maximálně lze užít šest dávek denně.
- Léčbu přípravkem ENTEROSGEL® přerušte, pokud 1–2 dny nemáte stolici, zvyšte příjem vody a pokračujte v léčbě po další stolici.

## 4. MOŽNÉ NEŽADOUcí ÚČINKY

Zácpa, nevolnost (nauzea)

## 5. JAK ENTEROSGEL® UCHOVÁVAT

- ENTEROSGEL® nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte ENTEROSGEL® při teplotách od 4 °C do 30 °C.
- Chraňte před mrazem.
- Nevystavujte nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření.
- Doba použitelnosti uvedená na obalu se vztahuje na řádně skladovaný neotevřený produkt.

**Sáčky**

- Po otevření lze každý sáček použít jen jednou.
- Sáčky jsou na jedno použití a musí se otevírat bezprostředně před použitím.
- Nepoužívejte opětovně částečně použité sáčky, abyste zabránili mikrobiálnímu znečištění.

**Tuby**

- Po otevření a každém použití uzavřete pevně víčko tuby, aby nedošlo k vysychání a mikrobiálnímu znečištění.

**Při vymačkávání přípravku ENTEROSGEL® z tuby nebo sáčku se může objevit malé množství tekutiny.**

## 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

**Složení:** Polymethylsiloxane polyhydrate (hydrogel kyseliny metylkřemičité) – 70 %, čišťená voda – 30 %.

**Velikosti balení**

ENTEROSGEL® perorální suspenze  
– Tuba 225 g  
– Tuba 90 g  
– Sáček 15 g (10 sáčků v balení)

**LIKVIDACE**

Na likvidaci nepoužitého přípravku ENTEROSGEL® se nevztahují žádné zvláštní opatření. Přípravek může být bezpečně vhozen do domácího odpadu. Obal lze recyklovat.

**Trvanlivost:** do data uvedeného na obalu

**Máte-li další dotazy týkající se užívání přípravku ENTEROSGEL®, obraťte se prosím emailem na: [info@enterosgel.eu](mailto:info@enterosgel.eu).**

Tento příbalový leták je k dispozici též v jiných jazycích na [www.enterosgel.eu](http://www.enterosgel.eu).

## VYSVĚTLIVKY GRAFICKÝCH SYMBOLŮ NA OBALU:



Nepoužívejte opakovaně



Certifikovaný zdravotnický prostředek



Minimální trvanlivost



Jednorázový obal

**LOT**

Šarže



Použitý obal umístíte do příslušné odpadní nádoby. Obal je recyklovatelný



Výrobce



Čtete prosím návod



Za toto balení byl uhrazen poplatek autorizované společnosti.



Rozsah teplot



Forest Stewardship Council



Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření

**VÝROBCE:**

**Bioline** Products

Bioline Products s.r.o.  
Krakovská 1338/10,  
110 00 Praha, Česká republika  
[www.enterosgel.eu](http://www.enterosgel.eu)

**DATUM AKTUALIZOVANÉ VERZE PŘÍBALOVÉHO LETÁKU:** 08.08.2022

**VERZE:** TUV/IFU/CZ/NB/2

**DISTRIBUTOR:**

Asure Pharma s.r.o.  
Pátkova 831  
182 00 Praha 8  
[info@asurepharma.com](mailto:info@asurepharma.com)

**CE 0123**

Zdravotnický prostředek třídy IIa